

بررسی کیفیت نسخ بیمه خدمات درمانی دندانپزشکان شهر تبریز در نیمه دوم سال ۱۳۸۴

سعید نظافتی: گروه جراحی دهان فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ نویسنده رابط E-mail: nezaf2000@yahoo.com

نسرین مالکی: گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رقیه قلیخانی: گروه سلامت دهان و دندان و مدارس، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دریافت: ۸۷/۱۰/۱۴، پذیرش: ۸۶/۱۰/۱۳

چکیده

زمینه و اهداف: برای تسريع روند درمان و بهبودی بیمار و نیز جهت پیشگیری از عواقب نامطلوب پزشکی، دندانپزشکان باید از خطاهای نسخه نویسی مانند شکل دارویی، دوز، تداخلات دارویی و ... آگاه باشد. بر این اساس در این مطالعه خطاهای نسخه نویسی دندانپزشکان شهر تبریز در نسخ بیمه خدمات درمانی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

روش بررسی: ۶۶۶ نسخه بیمه خدمات درمانی بصورت تصادفی از میان نسخ تجویز شده توسط دندانپزشکان شهر تبریز در یک دوره شش ماهه انتخاب شده و به صورت گذشته نگر از نظر وجود خطا در شکل دارویی، نام دارو، دوز دارو، فاصله دوزها، روش تجویز، تعداد اقلام هر نسخه و تداخل دارویی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته ها: ۹۷/۰۵٪ از نسخ مورد بررسی دارای خطا بودند. نام داروها در ۹۴/۹٪، روش تجویز در ۷۲/۴٪ و دوز داروها در ۶۰/۸٪ از نسخ مورد بررسی، اشتباه نوشته شده بودند. ۲۷/۶٪ از نسخ تداخل دارویی بین اقلام تجویزی داشته و ۵/۳٪ از نسخ دارای خطا در شکل دارویی بودند.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه اکثر نسخ بررسی شده دارای خطا بودند، پیشنهاد میشود در برنامه های درسی رشته دندانپزشکی و نیز در برنامه های مدون بازآموزی دندانپزشکان بر اصول صحیح نسخه نویسی تاکید بیشتر گردد. ضمناً با در نظر گرفتن کسوراتی برای نسخ دارای خطا میتوان دندانپزشکان را برای رعایت اصول صحیح نسخه نویسی ترغیب نمود.

کلید واژه ها: خطاهای نسخه نویسی، تجویز دارو، خطاهای دارویی

مقدمه

دارو، یا آسیب به بیمار شود، در حالی که دارو تحت کنترل شاغلین حرفة های بهداشتی، بیمار یا مصرف کننده باشد (۲). طبق مطالعات گزارش شده از موسسه پزشکی آمریکا، با عنوان «انسان جایز الخطاست: سیستم سلامتی سالم تر بر پا کنیم»، هر ساله ۴۴ هزار تا ۹۸ هزار آمریکایی در نتیجه خطاهای پزشکی می میرند. خطاهای پزشکی هشتمین علت مرگ در آمریکا گزارش شده است (۳). طبق گزارش کمیسیون مشترک اعتبار بخشی

تجویز دارو یکی از مهمترین مراحل درمانی در دندانپزشکی است. دندانپزشکان باید در خصوص موارد تجویز و عدم تجویز، تداخلات و اثرات جانبی داروها اطلاعات کافی داشته باشند (۱). خطای ناشی از تجویز دارو، پدیده ای رایج است. طبق تعریف انجمان هماهنگی ملی برای گزارش و پیشگیری از خطاهای تجویز دارو خطای ناشی از تجویز دارو عبارت است از: هر رویداد قابل پیشگیری که ممکن است باعث یا منجر به استفاده نامناسب از

نوشته نشده یا خوانا نباشد. خطاب در نوشتن "دوز دارو" یعنی این که دوز دارو با آنچه که در کتاب ایران فارما وجود دارد، مطابق نبوده، یا این که دوز نوشته نشده باشد. خطاب در نوشتن "فاصله دوزها" به معنی اینکه فواصل مصرف دارو با کتاب ایران فارما منطبق نبوده یا فاصله مصرف دارو نوشته نشده نبوده و یا این که عبارت "طبق دستور" نوشته شده باشد. خطاب در نوشتن "روش تجویز" یعنی روش تجویز نوشته نشده یا این که صحیح نبوده و یا اینکه عبارت "طبق دستور" نوشته شده باشد. خطاب در "تدخل دارویی" به معنی این که بین اقلام یک نسخه، تداخل دارویی وجود داشته باشد. در این مطالعه، به دلیل نوشته نشدن فارماکوپه رسمی در ایران، از کتاب ایران فارما به عنوان استاندارد استفاده گردید (۱۰). پس از تهیه چک لیست، بهمکاری کارشناس داروی سازمان بیمه خدمات درمانی چک لیست مذکور برای هر نسخه تکمیل گردید. همچنین، انواع داروهای تجویز شده در نسخ نیز مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مربوط به هر نسخه پس از گردآوری بصورت جدول توزیع فراوانی ارایه و مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

داروهایی که در نسخ مورد بررسی تجویز شده بودند شامل آستی بیوتیکها، ضد دردها و ضد التهابی غیراسترئویدی، کورتیکواستروئیدها، دهانشویه ها و چند داروی دیگر که ارتباط چندانی با حیطه کاری دندانپزشکی ندارند، بود. بیشترین داروی تجویزی، آموکسی سیلین با فراوانی $52/40\%$ و کمترین آن رانیتیدین با فراوانی $0/15\%$ بود. سایر داروهای استفاده شده به ترتیب عبارتند بودند از: ایوبپروفن، دگزاماتازون، استامینوفن کدئین، مترونیدازول، پنیسیلین G، سفالکسین، استامینوفن، پنیسیلین ۳-۶، پنیسیلین V، کلرهگریدین گلوکونات، نیستاتین، بتاماتازون، داکسی سایکلین، سدیم کلراید، کوآموکسی کلاو، سدیم فلوراید، پرسیکا، آسپرین، اریترومایسین، تتراسایکلین HCl، ایرشا، آمپی سیلین، سفکسیم، ضد سرماخوردگی و سفتریاکسون سدیم. از نسخ دارای $2/76\%$ یا $3/3\%$ قلم دارو بودند.

در حالت کلی $98/05\%$ از نسخ مورد بررسی دارای خطاب بودند. در بررسی خطاهای $5/3\%$ از نسخ، خطاب در شکل دارویی داشتند که اغلب مربوط به شکل دارویی دهانشویه ها بود که نوشته نشده بود و یا نادرست بود. یک مورد مربوط به پرسیکا بود. شکل دارویی پرسیکا که برای بیماری های دهان به کار می رود، به صورت قطره غیر خوراکی است (۱۰) ولی در تمام نسخ، شکل دارویی آن به صورت دهانشویه ذکر شده بود. مثال دیگر، نوشتن نادرست شکل دارویی قرص سفکسیم و کوآموکسی کلاو بود که اغلب به صورت کپسول نوشته شده بودند. در حالی که شکل دارویی این داروها به صورت FC-Tab^۱ است (۱۰). در بررسی خطاهای نوشتن نام دارو، $94/9\%$ از نسخ، دارای خطاب در نوشتن نام دارو بودند که اکثر آنها مربوط به نوشتن ناکامل نام دارو بود. از خطاهای دیگر عدم درج نام دارو بود که در دهانشویه ها فقط واژه Mouth

سازمان های بهداشتی درمانی، بعضی از شایع ترین خطاهای پزشکی مرتبط با رساندن دارو به بیمار است (۳). مشکلات تجویز دارو منجر به خطاهای تجویز می شود. انجمن بیمه های پزشکی آمریکا در سال ۱۹۹۳ در مطالعه ای درباره خطاهای تجویز دارو، گزارش کرد که خطاب در نوشتن نسخه، شانزدهمین خطای شایع در میان دعاوی پزشکی بوده است (۴).

Lesar در سال ۲۰۰۲، خطاب در شکل دارویی را $69/7\%$ و در مطالعه ای دیگر در سال ۱۹۹۷، مجموع اشتباهات مربوط به نام دارو، دوزاژ غلط و اختصارات اشتباه را $11/4\%$ و خطاب در نوشتن دوز را $17/5\%$ گزارش کرده است (۵ و ۶). این در حالی است که خطاب در نوشتن دوز را Fortescue و همکاران در سال ۲۰۰۳ و Mirco و همکاران در سال ۲۰۰۵ به ترتیب $28/2\%$ و $20/2\%$ اعلام کرده اند. در همان مطالعه، Fortescue و همکاران خطاب در نوشتن فاصله دوز ها را $9/4\%$ گزارش نموده اند (۷ و ۸). خطاب در نوشتن روش تجویز را Fortescue و همکاران و Mirco و همکاران به ترتیب $18/1\%$ و $13/3\%$ گزارش کرده اند (۷ و ۸). Souza و Thomson در سال ۲۰۰۶، فراوانی تداخلات دارویی را $49/7\%$ ذکر کرده اند (۸). متسفانه در داخل کشور مطالعه ای که به خطاهای نسخه نویسی در دندانپزشکی پرداخته شده باشد از بانک Iranian Information and Documentation Center SID، IRAN MEDEX بدبست نیامد. تنها یک مطالعه در سال ۱۳۸۰ در استان کرمان به بررسی الگوی نسخه نویسی دندانپزشکان یعنی تعداد و نوع داروهای تجویزی پرداخته است که نتایج حاصله با توجه به هدف متفاوت مطالعه، قابل طرح در این مقاله نمی باشد (۹).

به طور کلی یکی از روشهای کاهش خطاهای ناشی از تجویز دارو بررسی نسخ تجویزی می باشد (۳). از این رو و با توجه به خطاهای گزارش شده (۳-۸)، انجام این بررسی در شهر تبریز و مقایسه آن با مطالعات انجام شده، لازم به نظر می رسد.

مواد و روش ها

این مطالعه به صورت توصیفی و گذشته نگر انجام گرفت. با توجه به این که برآورده از نسبت خطاب در نسخ بیمه دندانپزشکان شهر تبریز بدبست نیامد، حداقل نمونه ممکن ($P=0/05$) با احتمال $0/1$ و خطای مجاز $0/05$ تعیین شد. براین اساس، ۶۶۶ نسخه دندانپزشکی از نسخ بیمه خدمات درمانی با روش نمونه گیری ساده تصادفی از نسخه های موجود درسازمان بیمه خدمات درمانی و مربوط به نیمه دوم سال ۱۳۸۴ انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها چک لیستی مشتمل بر شکل دارو، نام دارو، دوز دارو، تعداد دارو، فاصله دوزها، روش تجویز، وجود تداخل دارویی بین اقلام تجویز شده در یک نسخه و تعداد اقلام هر نسخه تهیه گردید. خطاب در نوشتن "شکل دارویی" به این معنی است که شکل دارویی نوشته نشده باشد یا اشتباه نوشته شده باشد. خطاب در نوشتن "نام دارو" یعنی نام دارو از نظر املایی صحیح نباشد یا نام دارو کلا

1. Film-Coated Tablet, FC-Tab

مطالعه احتمالاً به این دلیل است که برخی دندانپزشکان به علت مسایلی چون صرفه جویی در وقت، راحتی یا فراموش کردن فاصله دوز یا با این تصور که دارو ساز هنگام تحویل دارو فاصله دوزها را نیز روی هر دارو خواهد نوشت، عبارت «طبق دستور» را به جای فاصله دوز دارو می نویسند. در حالیکه ذکر دقیق دوز و فاصله مصرف ممکن است از یک بیمار به بیمار دیگر متفاوت باشد (۲/۱۱). خطأ در نوشتن روش تجویز در این مطالعه نسبت به مطالعات متشر شده (%۹۲/۸ در مقابل %۱۸-٪۱۳۳) بسیار بالا بود (۷/۶). بالا بودن بسیار زیاد این خطأ را می توان به عدم درج روش مصرف در اکثر داروهای خوراکی تجویز شده نسبت داد. تداخلات دارویی در مطالعات قبلی (%۴۹/۷) گزارش شده بود (۸) که در این مطالعه این میزان %۲۷/۶ بود و عمدتاً مربوط به تجویز همزمان کورتیکواستروئیدها و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی بود. مصرف همزمان این دو گونه داروئی، خطر زخم و خونریزی دستگاه گوارش را بالا می برد (۱۰). نمونه دیگر، تجویز همزمان پنی سیلین G و اریترومایسین بود. داروهای ضد میکروبی که باکتریوستاتیک می باشند (مانند کلرامفینکل، تتراسایکلین و اریترومایسین) می توانند اثر ضد میکروبی پنی سیلین G را خشی نمایند و استفاده همزمان توصیه نمی شود (۱۰). علاوه بر تداخلات دارویی که ممکن است بین اقلام یک نسخه وجود داشته باشد، احتمال دارد که بین داروهایی که دندانپزشک تجویز می کند و داروهایی که بیمار از قبل مصرف می کرد تداخلاتی بوده باشد که با افزایش سن احتمال مصرف این داروها و بروز تداخلات دارویی نیز افزایش می باید (۱۲). آموکسی سیلین فراوان ترین داروی تجویزی در بین نسخ مورد بررسی بود. آنتی بیوتیکها از جمله آموکسی سیلین تداخل بسیار مهمی با داروهای ضد بارداری خوراکی دارند و اثر این داروهارا کاهش می دهند. این موضوع در آنتی بیوتیکهای دیگری چون پنی سیلین ۷ و آمپی سیلین هم صادق است. در تجویز داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و ضد دردها، بیشترین فراوانی مربوط به ایبوپروفن و استامینوفن کلین بود. با توجه به بروز زیاد بیماریهای چون بیماری گوارشی، اختلالات انعقادی، آسم، بیماری های آلرژیک و ... بیمارانی که کورتیکواستروئید و الكل مصرف می کنند، احتمال تداخل ایبوپروفن با آنها وجود داشت (۱۰). استفاده از مهار کننده های اختصاصی کوکس ۲، (سایکلوکسیژنار-۲) نظری سلکسیب. در کاهش خونریزی و زخم های گوارشی، جایگزینی مناسب برای داروهای ضد التهاب غیر استروئید های قدیمی است (۱۳). بیشترین مورد تجویز داروهای کورتیکواستروئید مربوط به آمپول دگزاماتازون بود. تجویز این دسته داروها در بیماران دیابتی، بیماران با زخم های گوارشی، اختلالات خونریزی دهنده و ... مناسب نمی باشد (۱۰). در تعداد اندکی از نسخ، داروهایی از قبیل سرما خوردگی، کلسیم فورت، هماتینیک و رانیتیدین تجویز شده بود که ارتباطی با حیطه کاری دندانپزشکی ندارند. لازم به ذکر است در یک نسخه که رانیتیدین تجویز شده بود، نام خانوادگی دندانپزشک

Wash بدون ذکر نوع آن نوشته شده بود. ۶۰/۸٪ نسخ مورد بررسی، خطأ در نوشتن "دوز داروها" داشتند. که بیشتر مربوط به نوشته نشدن دوز کلین و استامینوفن در استامینوفن کلین، دوز آمپول دگزاماتازون و دوز دهانشویه هایی بود که در دوزهای مختلف عرضه می شوند.

۷۲/۴٪ از نسخ، دارای خطأ در نوشتن فاصله دوزها بودند که فاصله دوزها اشتباه بود یا نوشته نشده بود. ضمناً در %۱۶/۲۰ از نسخ عبارت «طبق دستور» نوشته شده بود.

۹۲/۸٪ نسخ مورد بررسی، دارای خطأ نوشتن روش تجویز دارو بودند که بیشترین علت آن مربوط به عدم درج روش مصرف در اکثر داروهای خوراکی بود. نوشته نشدن روش تجویز داروهای تزریقی از موارد دیگر این نوع خطأ بود.

۲۷/۶٪ از نسخ، تداخلات دارویی بین اقلام تجویزی وجود داشت که از آن جمله می توان به تجویز همزمان داروهای دسته ضد التهاب غیر استروئیدی و کورتیکواستروئید اشاره کرد. نمونه ای دیگر تجویز همزمان پنی سیلین G و اریترومایسین بود.

بحث

در بانکهای اطلاعاتی مورد جستجو، متاسفانه مطالعه ای که اختصاصاً به بررسی خطاهای نسخه نویسی در دندانپزشکی پرداخته باشد، بدست نیامد و به ناچار نتایج این مطالعه با تحقیقات مربوط به خطاهای نسخ پزشکی مقایسه گردید. خطاهای مربوط به نوشتن شکل دارویی در این مطالعه بر خلاف نتایج سایر مطالعات کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده بود (%۵/۳) در مقابله (%۶۹/۷) (۵). این اختلاف زیاد ممکن است به دلیل محدود بودن انواع داروهای تجویز شده در حیطه دندانپزشکی باشد که موجب می شود به خاطر سپردن شکل دارویی مورد استفاده در دندانپزشکی راحت تر باشد. در بررسی خطاهای نوشتن شکل دارویی، کوآموکسی کلارو به صورت کپسول نوشته شده بود. علت می تواند مربوط به فرم بیضی مانند این داروها که شبیه کپسول است و بعضی دندانپزشکان اشتباه آنها را نیز کپسول می پنداشند، باشد. این دارو جزو داروهای نسبتاً جدید می باشد و شاید در مورد داروهای جدیدی که وارد بازار می شوند، اطلاع رسانی درستی به دندانپزشکان نمی شود. خطأ در نوشتن نام کامل دارو به مراتب بیشتر از سایر مطالعات بود (%۹۴/۹ در مقابل %۱۱/۴) (۴). بالا بودن میزان این خطأ در مطالعه حاضر شاید به این دلیل است که فقط نوشتن نام کامل دارو مطابق با نام دارو در کتاب ایران فارما معیار صحیح بودن نوشتن نام دارو تلقی گردید که با این معیار در اکثر نسخ، نام کامل دارو درج نشده بود. در این مطالعه خطأ در نوشتن دوز داروها بیش از نتایج سایر مطالعات متشر شده بود (%۶۰/۸ در مقابله %۳۰-٪۱۷/۵) (۷) که نشان دهنده کم اهمیت بودن این موضوع نزد دندانپزشکان می باشد. خطأ در نوشتن فاصله دوزها در این مطالعه نیز در مقایسه با نتایج مطالعات قبلی بالا بود (%۷۲/۴ در مقابله %۹) (۶). میزان بالای خطأ در این

ندارد و علی رغم ارائه مطالبی در مورد داروهای مورد استفاده در برنامه های فوق، جای برنامه های اختصاصی در رابطه با کاربرد صحیح این داروها و نوشتن یک نسخه عاری از اشتباه خالی به نظر می رسد. ضمناً با در نظر گرفتن کسوراتی برای نسخ دارای خطای میتوان دندانپزشکان را برای رعایت اصول صحیح نسخه نویسی ترغیب نمود.

تقدیر و تشکر

بدینوسیله از زحمات جناب آقای دکتر حسن آقاجانی، جناب آقای دکتر تقی صادقیان و جناب آقای دکتر سیامک علیمند که ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند، سپاسگزاری می شود.

با نام خانوادگی بیمار یکی بود. مشاهدات فوق میبن لزوم برگزاری برنامه های آموزش مداوم نسخه نویسی برای دندانپزشکان شهر تبریز می باشد. در یک بررسی اجمالی بر روی دستورالعمل اجرایی برنامه مدون دندانپزشکان مشاهده شد که در سه برنامه مدون در مورد استفاده از داروها مطالبی گنجانده شده است که در ذیل آورده می شود: برنامه مدون جراحی یک (کد ۳۳۰۳۰۵) در مورد اصول آنتی بیوتیک تراپی در عفونتهای دهان، فک و صورت. برنامه مدون بیماریهای دهان و دندان دو (کد ۳۳۰۳۰۱۵) در مورد آشنایی با داروهای مورد استفاده در بیماریهای مخاط دهان. برنامه مدون درمان ریشه (کد ۳۳۰۳۰۱۷) در مورد داروهای کنترل کننده درد. همان گونه که ملاحظه می شود برنامه مشخصی در مورد آموزش اهمیت و اصول نسخه نویسی و تداخلات دارویی وجود

References

1. Marek CL. Avoiding prescribing errors: A systematic approach. *J Am Dent Assoc* 1996; **127**(5): 617-623.
2. National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. What is a medication error 2007. <http://www.nccmerp.org/aboutMedErrors.htm> (Accessed July 2007).
3. Joshi MC. Medication error reporting through prescription auditing. Express Healthcare Management,2005. <http://www.expresshealthcaregmt.com/20050630/insight01.html> (Accessed June 2007).
4. NORCAL Mutual Insurance Company. Medication errors prescription ordering problems and incorrect administration of medication, 2004. http://www.norcalmutual.com/publications/claims/apr_04.pdf. (Accessed July 2007).
5. Lesar TS. Prescribing errors involving medication dosage forms. *J Gen Intern Med* 2002; **17**(8): 579-587.
6. Fortescue EB, Kaushal R, Landrigan CP, McKenna KJ, Clapp MD, Federico F, et al. Prioritizing strategies for preventing medication errors and adverse drug events in pediatric inpatients. *Pediatrics* 2003; **111**(4): 722-729.
7. Mirco A, Campos L, Falcão F, Nunes JS, Aleixo A. Medication errors in an internal medicine department. Evaluation of a computerized prescription system. *Pharm World Sci* 2005; **27**(4): 351-352.
8. Crucial-Souza JM, Thomson JC. A pharmaco epidemiologic study of drug interactions in a Brazilian teaching hospital. *Clinics* 2006; **61**(6): 515-520.
9. Sepehri G, Dadollahi Y. *Evaluation of Dentists Prescription Pattern of Kerman Province in 2001*. Dental Faculty J of Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2006, **24** (1): 94-101.
10. Shahraz S, Ghazvini T. Iran Pharma, *Text book of Iranian Pharmacopoeia*.3rded, Tehran, Teimoorzadeh, 2002; PP: 28-33.
11. Lofholm PW, Katzung BG. Rational Prescribing & Prescription Writing. In: Katzung BG. *Basic and Clinical Pharmacology*. 10th ed. New York; McGraw-Hill, 2007; PP: 1063-1073.
12. Samizadeh M. *The most important drug interactions*. 1st ed. Tehran, Teimoorzadeh Publishing, 2004; PP:34-35.
13. PDR health. Drug & Supplements, 2007, <http://www.pdrhealth.com/drugs/drugs-index.aspx>. (Accessed July 2007).