

مقایسه ارزش تشخیصی MRI و پتانسیل برانگیخته شنوایی در شناسایی ضایعات نهفته ساقه مغز در مالتیپل اسکلروزیس

دکتر مهناز طالبی: استادیار گروه بیماریهای مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز: نویسنده رابط

E-mail: Talebineuro@yahoo.com

دکتر ویدا حاج محمد حسنی محققی: دستیار بیماریهای مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دریافت: ۸۴/۷/۲۷ پذیرش: ۸۴/۱۰/۱۹

چکیده

زمینه و اهداف: مولتیپل اسکلروزیس به خاطر فرکانس و تمایل به گرفتاری افراد جوان یکی از مهمترین بیماریهای نورولوژیک است. مشخص کردن بیمارانی که ضایعات نهفته از لحاظ بالینی دارند مهم است چرا که درمانهای زودرس در جلوگیری از عدم توانایی در بیماران (Multiple sclerosis, MS) مؤثرند. یک تعداد از تستهای فیزیولوژیک و رادیولوژیک حساس، مانند(Magnetic Resonance Imaging, MRI) و پتانسیلهای برانگیخته سه گانه، ضایعات بدون علامت را ثابت می کنند. MRI یک متد انتخابی در تشخیص MS است و تست برانگیخته شنوایی ساقه مغز (Brainstem auditory evoked potentials, BAEP) یک متد کم هزینه و غیرتهاجمی در شناسایی پلاکهای ساقه مغز می باشد. این مطالعه برای مقایسه نقش این دو تست بر روی بیماران MS صورت گرفت.

روش بررسی: ۳۰ بیمار که از نظر بالینی و پاراکلینیکی کراتیتیهای تشخیص MS مسجل را بدون درگیری ساقه مغز از نظر بالینی داشتند، در این مطالعه شرکت داده شدند، از این بیماران BAEP و MRI به عمل آمد که یافته های غیر طبیعی در BAEP عمدتاً بر اساس تأخیر بین موجهای I-III-V >2ms و تأخیر موج V >5.7ms بود. نهایتاً یافته های این دو متد با هم مقایسه گردید.

یافته ها: BAEP در ۳۳/۳٪ بیماران MRI در ۳۷/۶٪ بیماران مختلف بود. میزان همزمانی اختلال این دو تست در کل بیماران ۱۳/۳٪ می باشد. درگیری ساقه مغز با استفاده از هر دو روش در ۵/۶٪ موارد وجود دارد. لذا در درصد بالایی از افراد با MS مسجل که درگیری آسمپتوماتیک ساقه مغز را دارند، انجام این دو متد در کنار هم باعث شناسایی بیشتر موارد مثبت می شود. مقایسه بین اختلالات موجود در BAEP و MRI با جنس، نوع بیماری و مدت ابتلا به بیماری، تفاوت معنی داری نشان نداد.

نتیجه گیری: BAEP حتی زمانی که MRI در ساقه مغز ضایعه ای نشان نمی دهد یکی از روشهای خوب جهت بررسی درگیری ساقه مغز می باشد، اما تفاوت واضحی در تعیین موارد مثبت درگیری ساقه مغز با MRI ندارد لذا هیچکدام از این دو متد نمی تواند جایگزین یکدیگر در پیگیری بیماران مبتلا به MS مسجل در درگیری ناحیه ساقه مغز گردند ولی هر دو در کنار هم موارد مثبت بیشتری را شناسایی می کنند.

کلید واژه ها: پتانسیل برانگیخته شنوایی ساقه مغز، تصویربرداری رزنانس مغناطیسی، مولتیپل اسکلروزیس

مقدمه

مدت زمان لازم از اولین علائم تا تشخیص ۳-۶ سال گفته شده است(۳). جهت تشخیص این بیماری تست پاتوگنومیکی وجود ندارد و لیکن MRI، بررسی مایع مغزی نخاعی و پتانسیل های برانگیخته مهمترین متد های تشخیصی هستند. امروزه تکنیک های پیشرفت، راهکار جدیدی را جهت اثبات MS گشوده اند. حتی در بیمارانیکه فقط یک حمله منفرد نوریت اپتیک یا میلیت ترانسورس را داشته اند، این تست ها قادرند بیش از یک ضایعه را مشخص نمایند و تشخیص را از MS محتمل به سمت MS مسجل شوند. بر این اساس، MS به انواع زیر تقسیم می شود: ۱- MS مسجل از نظر کلینیکی ۲- MS مسجل با حمایت های آزمایشگاهی ۳- MS محتمل از نظر کلینیکی(۴).

مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری مزمن است که عمدتاً در جوانان ایجاد می شود. سیر کلینیکی این بیماری از فرم خوش خیم تا سریعاً پیشرونده و ناتوان کننده متفاوت است. غالباً بصورت عود و بهبودهای مکرر است. در ابتدا بهبود از عودها اکثراً کامل است، اما بعدها ناتوانی های نورولوژیک بتدربیج شروع می شوند(۱).

مولتیپل اسکلروزیس بدليل فرکانس، و تمایلش به گرفتاری افراد جوان یکی از مهمترین بیماریهای اعصاب است(۲). اوج شیوع سنی ۲۰-۳۰ سالگی می باشد و در زنان ۱/۴-۱/۳ برابر بیشتر از مردان است. تشخیص MS عموماً مدت زمان زیادی لازم دارد چون سایر بیماریهای مشابه دیگر باید کنار گذاشته شوند.

شده بود. در ضمن معاینه و انجام تست BAEP همگی توسط یک نفر متخصص مغز و اعصاب انجام گرفت. در MRI محل و مشخصات پلاک های دمینیزان یعنی وجود آنها در ناحیه ساقه مغز و داشتن پلاک های منطبق با مشخصات پلاک های MS مورد بررسی قرار گرفت. تشخیص های افتراقی که مهمترین آنها بیماریهای ایسکمیک و واسکولیت ها بودند با بررسی های تکمیلی کثار گذاشته شدند. نهایتاً ۳۰ بیمار (۱۲ نفر مذکور و ۱۷ نفر مؤنث) که شرایط لازم جهت مطالعه را داشتند یعنی MS مسجل با معیارهای Posser بدون عالیم بالینی درگیری ساقه مغز، وارد مطالعه شدند.

از این ۳۰ بیمار در بخش الکترودیاگنوستیک اعصاب با دستگاه Toennies Neuroscreen® plus چهار کاناله در فاصله زمانی ۹-۱۲ صبح تست BAEP با کاربرد تحریک تک گوشی و با فرکانس ۱۴ تحریک در ثانیه و ۲۰۰۰ تحریک در کل و با محل Cz-Fz انجام گرفت. زمان تأخیری امواج V, IV, III, II, I و فاصله زمانی بین امواج I-III و V-III ثبت گردید. معیار زمانی مورد مطالعه برای امواج به ترتیب زیر بودند:

$$\begin{array}{lll} I=1/6 & II=2/8 & III=3/8 \\ IV=5/1 & V=5/7 & I-III=2/3 \end{array}$$

III-V=۱/۸ و طولانی بودن زمان تأخیر امواج III-V و I-III و V با پیش از ۰/۳ انحراف معیار از حداقل مقدار، غیر طبیعی تلقی گردید(۷).

اطلاعات تمام بیماران وارد پرسشنامه های مربوطه گردید. طول مدت بیماری از زمان تشخیص و فرم بالینی MS مورد ارزیابی قرار گرفت. نهایتاً اطلاعات با نرم افزار آماری SPSS 11.5 و آزمون آماری کای دو مورد انتالیز قرار گرفت.

یافته ها

۳۰ بیمار با فاصله سنی ۴۸-۱۹ سال و با میانگین $31/9 \pm 8/4$ سال مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه مورد مطالعه شامل ۱۳ مذکر (۳/۴۳٪) و ۱۷ نفر مؤنث (۵/۶۷٪) بودند. تمامی بیماران معیارهای بالینی MS مسجل را بدون عالیم درگیری ساقه مغز داشتند. ۱۱ نفر (۳/۶۷٪) بیماری را بمدت پیش از ۵ سال و ۱۹ نفر (۶/۳٪) بمدت کمتر از ۵ سال داشتند. فرم بالینی MS در ۲۳ نفر (۷/۶۷٪) از نوع عود - بهبود و در ۷ نفر (۲/۳٪) از نوع مزمن پیشرونده بود.

از ۳۰ بیماری که BAEP در آنها انجام گرفت در ۱۰ بیمار (۳/۳٪) مختلط بود. در ۵ مورد فاصله موج های V-III، در دو مورد موج V طولانی و در سه مورد موج V و فاصله موج های V-III هر دو طولانی بود. تعداد افراد مذکر در گروه با BAEP مختلط ۶ نفر (۰/۴۶٪) و مؤنث ۴ نفر (۰/۲۳٪) بود ($P=0/193$). میانگین سنی بیماران در گروه BAEP مختلط $31/7 \pm 9/2$ سال بود و در گروه BAEP طبیعی $32/2 \pm 7/8$ سال بود که با توجه به $P=0/893$ معنی دار نمی باشد. BAEP مختلط در بیماران با فرم بالینی عود-بهبود در ۷ بیمار

زمانیکه شواهد کلینیکی نشانگر درگیری یک ناحیه در سیستم اعصاب مرکزی باشد(۱) در مراحل اولیه بیماری) تست های فیزیولوژیک و رادیولوژیک حساس می توانند ضایعات بدون علامت را در سایر نواحی سیستم اعصاب مرکزی نمایان سازند (۲). در بعضی موارد، ضایعات نهفته کلینیکی یک دلیل عدم استفاده از پتانسیل های برانگیخته در این بیماران است. از جمله تکنیک های بکاررفته جهت بررسی ضایعات نهفته، MRI و پتانسیل برانگیخته شنوازی ساقه مغز، پتانسیل برانگیخته بینایی و پتانسیل برانگیخته حسی می باشد(۵). پتانسیل برانگیخته شنوازی ساقه مغز (BAEP) یکسری سیگنالهایی با زمان های متغیر است که بدنبال تحريك گذراي شنوازی توسط گوش و قسمت های مربوطه سیستم عصبی تولید و قادر به بررسی سیستم محیطی و مرکزی شنوازی می باشد. مهمترین قسمت بررسی شنوازی مرکزی در BAEP هسته olivary فوکانی در پونز، لاترال لمینیسکوس و کالیکولوس تحتانی در میدبرین می باشد. در BAEP پترن های مختلف غیر طبیعی در MS وجود دارد که این گوناگونی پترن ها به علت تعدد نواحی درگیر در این بیماری می باشد. از جمله، این اختلال ممکنست در فاصله زمانی بین موج های I-III یا I-V یا هر دو یا طولانی شدن زمان موج I یا Chiapp ۱۴ بیمار مبتلا به MS، شایعترین یافته غیر طبیعی BAEP، اختلال آمپلیتود موج V (در ۸/۷٪ موارد) و اختلال بعدی افزایش زمان بین موج های III-V بود(۷).

یکی از تکنیک های با ارزش جهت تشخیص MS، روش MRI میباشد که قادر است ضایعات را در ۹۰٪ موارد نشان دهد و متد انتخابی در تشخیص MS قلمدادمی شود. از نواحی شایع پلاک ها، ماده سفید اطراف بطن ها، ستروم سمی اوال و کورپوس كالوزوم می باشد(۱ و ۳).

هدف از این بررسی مقایسه توانایی BAEP و MRI در یافتن ضایعات نهفته ساقه مغز در بیماران MS مسجل بدون عالیم بالینی درگیری ساقه مغز می باشد.

مواد و روش ها

این مطالعه بصورت توصیفی- تحلیلی به مدت یکسال از اول اسفند ۸۲ لغایت اسفند ۸۳ در بخش الکترودیاگنوستیک اعصاب بیمارستان امام خمینی انجام گرفت. ابتدا ۷۷ بیمار که براساس معیارهای Posser تشخیص MS مسجل داشتند، از مراجعه کنندگان به کلینیک تخصصی دانشگاه و بیمارستان امام انتخاب شدند. از این تعداد، ۲۶ بیمار به علت داشتن عالیم بالینی درگیری ساقه مغز از مطالعه حذف شوند. از ۵۱ بیمار باقیمانده که فاقد عالیم درگیری ساقه مغز بودند، جهت جلوگیری از هزینه اضافی MRI، بیمارانی انتخاب شدند که طی دو ماه اخیر MRI به هر دلیلی برای آنها انجام شده بود یا به علت عود بیماری نیاز به انجام MRI مجدد داشتند، همچنین بیمارانی وارد مطالعه شدند که در تمام آنها MRI با دستگاه HITACHI Permanent 0/2 tesla انجام

پلاک ها در مسیر مورد بررسی BAEP قرار نگیرند و لذا منجر به اختلال آن نشوند.

از طرف دیگر به نسبت مشابه بیمارانی وجود داشتند که BAEP مختل با MRI طبیعی ساقه مغز داشتند که علت آن می تواند اختلالات فونکسیون عصبی در مسیر راههای شنوایی به علت پلاک های خیلی کوچک باشد.

ناهمزمانی اختلالات MRI و BAEP و ناهمخوانی وجود اختلال توأم انها نشان می دهد که در بررسی ساقه مغز به روش پاراکلینیکی، اکتفا کردن به MRI کافی نمی باشد و از طرف دیگر انجام BAEP نیز برای رد کردن قطعی درگیری ساقه مغز کفايت نخواهد کرد.

همانطوریکه در قسمت نتایج ذکر شد، از ۳۰ بیمار مورد مطالعه در ۴ بیمار (۱۳٪) هر دو تست بطور همزمان مختل، در ۳۶٪ فقط MRI مختل و ۳۳٪ فقط BAEP مختل و در ۵٪ می باشد. یکی از دو روش مختل بود. در مطالعه Baum و همکارانش روی ۴۳ بیمار، ضایعات ساقه مغز در ۴۴٪ با BAEP و ۳۹٪ موارد با MRI و ۷۱٪ موارد با هر دو روش شناسایی شده اند (نتیجه این مطالعه حاکمی از آن است که BAEP در شناسایی ضایعات متشر MS بجای متدهای تصویری گران قیمت، اهمیت خود را حفظ کرده است).^(۸)

در مطالعه Comi بر روی ۳۳ بیمار MS قطعی (این بیماران از لحاظ درگیری ساقه مغز Select نشده بودند) ۳۱ بیمار MRI مختل و در همگی حداقل یکی از تستهای پتانسیل تحربیکی مختل بود. نتیجه این مطالعه بیان می کند که BAEP حساس تراز MRI در شناسایی درگیری ضایعات ساقه مغز می باشد و طبق این مطالعه به کارگیری توأم MRI و پتانسیل های تحربیکی در شناسایی ضایعات نهفته مغز اهمیت بیشتری دارد.^(۹) در مطالعه Stufflebeam تصویربرداری در لوکالیزه کردن ضایعات ساقه مغز با ارزش تر گزارش شده است.^(۱۰).

در مطالعات دیوبد و همکاران بر روی ۲۷ بیمار MS نقش MRI را در تعیین ضایعات نهفته با ارزش تر از BAEP گزارش کرده اند.^(۱۱).

Capra معتقد است که BAEP در مقایسه با MRI، ظرفیت بیشتر و قیمت کمتری در شناسایی پلاک های ساقه مغز هم در بیماران حاد با عالیم درگیری ساقه مغز و هم در بیمارانی که از لحاظ کلینیکی درگیری ساقه مغز ندارند، دارد و BAEP را به عنوان یک تکنیک مفید در موارد شک به ضایعات ساقه مغز و کنترل پیشرفته بیماری، پیشنهاد می کند.^(۱۲).

BAEP Merritt را در شناسایی اختلالات در بیماران غیرعلاءه تر کم ارزش ولی در شناسایی اختلالات در بیماران با عالیم درگیری ساقه مغز مفید می داند.^(۱).

در مطالعه Chiappa، بیمارانی که عالیم بالینی ساقه مغز را نداشتند، ۲۱ درصد BAEP غیر طبیعی داشتند.^(۷).

(۴٪) و در فرم مزمن پیشرونده در ۳ بیمار (۴٪) وجود داشت ($P=0.65$).

از ۱۰ بیمار با BAEP مختل، در ۴ نفر (۴٪) طول مدت بیماری بیش از ۵ سال و در ۶ نفر (۶٪) زیر ۵ سال بود.

MRI در ۱۱ نفر (۱۱٪) از بیماران مختل بود. مواردی از MRI، مختل در نظر گرفته شد که علاوه بر سایر معیارهای مک دونالد جهت تشخیص MS در ساقه مغز نیز پلاک وجود داشت و پلاک های ناحیه مدول اچون خارج از مسیر بررسی BAEP بود به عنوان موارد مختل وارد مطالعه نگردید. تعداد افراد مذکور در گروه با MRI مختل ۶ نفر (۶٪) و مؤنث ۵ نفر (۵٪) بود ($P=0.34$). میانگین سنی بیماران در گروه با MRI مختل ۳۰±۹/۰۴ و در گروه با MRI طبیعی ۳۰±۸/۰۴ می باشد ($P=0.28$). MRI مختل در بیماران با فرم بالینی عود - بهبود در ۸ مورد (۸٪) و در بیماران از نوع مزمن پیشرونده در ۳ مورد (۳٪) یافت شد. در بیماران با درگیری بالای ۵ سال MRI در ۴ نفر (۴٪) مختل و در گروه با درگیری کمتر از ۵ سال در ۷ نفر (۷٪) مختل بود.

از ۲۰ بیمار مبتلا به MS با BAEP طبیعی ۱۳ بیمار MRI طبیعی (۶۵٪) و ۷ نفر MRI مختل (۳۵٪) داشتند و از ۱۰ بیمار مبتلا به MS با BAEP مختل، ۶ نفر (۶٪) MRI طبیعی و ۴ نفر (۴٪) MRI مختل داشتند. و از ۱۰ بیماریکه BAEP مختل داشتند همزمان ۴ نفر غیر طبیعی داشتند. همزمانی مختل بودن این دو متدها در کل بیماران ۱۳٪ و درصد موارد مختل با استفاده از هر دو روش در کل بیماران ۵٪ می باشد.

بحث

در این مطالعه ۳۰ بیماریکه با معیارهای posser بیماری MS داشتند، جهت تعیین ضایعات نهفته ساقه مغز مورد بررسی MRI و BAEP قرار گرفتند. هدف تعیین و مقایسه توانایی دو روش فوق در جهت تشخیص ضایعات آسمپتوماتیک ساقه مغز بود. از ۳۰ بیماریکه از نظر بالینی عالیم درگیری ساقه مغز را نداشتند در ۱۷ مورد (۵٪) یکی از دو روش MRI یا BAEP مختل بود. نتایج ما نشان می دهد که درگیری ساقه مغز و اختلالات مشاهده شده در MRI و BAEP ارتباطی با طول مدت بیماری نداشته و در هر مرحله ای از سیر بیماری قابل مشاهده خواهد بود. همچنین این اختلالات ارتباطی با دوره سنی یا جنس بیمار نداشته و در هر جنس و سنی رخ می دهد. همچنین تفاوت معنی داری بین نوع بیماری و درگیری ساقه مغز وجود نداشت. نتایج بررسی MRI و BAEP در این مطالعه نشان دهنده ارزش ویژه هر کدام از آنها می باشد و همانطوریکه در بخش نتایج آمده است، غالباً اختلالات MRI بدون همراهی اختلالات BAEP مشاهده گردیده است، در توجیه این امر میتوان گفت که ساقه مغز منطقه نسبتاً وسیعی نسبت به محدوده بررسی BAEP را شامل می گردد و بنابراین ممکنست

در شناسایی ضایعات نهفته در این بیماران اهمیت زیادی دارد و ارجحیت خاصی بین BAEP و MRI نمی‌توان قائل گردید و همچنین استفاده از دستگاههای MRI با قدرت تشخیصی بالاتر بهتر می‌تواند ضایعات نهفته را نشان دهد.

نتیجه گیری

نهایتاً با توجه به تناقض های زیادی که در نظریه محققین وجود دارد و با توجه به مطالعه ما که با بعضی از مطالعات فوق همخوانی دارد میتوان نتیجه گرفت که اولاً درگیری آسمپتوماتیک ساقه مغز در MS شایع است و در ثانی بکار بردن توأم MRI و

References

- Miller G. Multiple sclerosis. In: Rowland L. Merritt's Neurology. 10th ed. Philadelphia; Williams & Wilkins, 2005; PP: 773-875.
- Silcox L, Smit C, Hume C. Occupational Therapy & Multiple Sclerosis. First ed. Philadelphia; Whurr publishers, 2003; PP: 2-7.
- Warren S G, Warren K. Multiple Sclerosis. 1th ed. Hong kong; World Health organization, 2001; pp: 16-27.
- Victor M, Ropper A. Principles of Neurology. Seventh ed. New york, Mc Graw, 2001; PP: 971-1001.
- Gronseth G, Ashman E. The usefulness of evoked potentials in identifying clinically silent lesions in patients with suspected multiple sclerosis. *Neurology* 2000; **54**:1720-1725.
- Legatt A. Brainstem Auditory Evoked potentials: Methodology, Interpretation and clinical application. In: Aminoff M. Electrodiagnosis in clinical Neurology. 4th ed. New york; Churchill livingstone, 1999; PP: 451-477.
- Chiappa K. Evoked potentials in clinical Medicine. 3th ed. Philadelphia, Lippincott- Raven, 1997; pp: 221-228.
- Baum K, Scheuler W, Hegerl V, Grike W. Detection of brainstem lesions in Multiple sclerosis: comparision of brainstem auditory evoked potentials with nuclear magnetic resonance imaging. *Acta Neur scand* 2001; **77**(4): 283-8.
- Comi G, Martinell V, Medaglini S, Locatell T, Filipp M, Canal N, et al. Correlation between multimodal evoked potentials and magnetic resonance imaging in multiple sclerosis. *J Neurol* 1999; **236**(1): 4-8.
- Stufflebeam S, Levine R, Gardner J, Fullerton B, Furst M, Rosen B. Objective detection and localization of Multiple sclerosis lesions on magnetic resonance brainstem imaging: Validation with auditory evoked potentials. *J Basic clin Physiol pharmaco* 2000; **11**(3): 231-58.
- David P, Ristori G, Elia M, Bartoli A, Ciervo A, Massaro A, et al. Multiple Sclerosis: Magnetic resonance imaging, Evoked potentials and cerebrospinal fluid analysis. *Acta Neurol* 2001; **12**(3): 200- 6.
- Capra R, Mattioli F, Vignolo L, Antonelli A, Bonfiol F, Cappiello J, et al. Lesion detection in MS Patients with and without clinical brainstem disorders: Magnetic resonance imaging and brainstem auditory evoked potentials compared. *Eur Neurol* 1989; **29**(6): 317.