

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوره ۳۳ شماره ۶ بهمن و اسفند ۱۳۹۰ صفحات ۸۲-۷۸

تأثیر عصاره هیدروالکلی راعی بر ریسک فاکتورهای مولد آترواسکلرroz در خرگوش‌های دریافت کننده رژیم آتروژن

نجمه کبیری: دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران، نویسنده رابط:

E-mail: kabiri_s97@yahoo.com

صدیقه عسکری: مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، مرگز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دریافت: ۸۹/۸/۲۲ پذیرش: ۹۰/۱/۶

چکیده

زمینه و اهداف: درمان و توقف ضایعات آترواسکلرزو ز یک هدف اساسی در بیماران می‌باشد. آنتی اکسیدانها و ترکیبات های پولیپیلیدمیک موجب توقف پیشرفت آترواسکلرزو و موجب درمان آترواسکلرزو می‌شوند. هدف از این مطالعه تعیین اثر عصاره هیدروالکلی راعی در درمان آترواسکلرزو در خرگوش‌های هایپرکلسترولمی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: خرگوش‌ها به طور تصادفی در ۴ گروه ۵ تایی تقسیم شدند. گروه اول با رژیم غذایی استاندارد به مدت ۷۵ روز، گروه دوم با رژیم پرکلسترول (کلسترول یک درصد وزن غذا) به مدت ۷۵ روز، خرگوش‌ها در گروه ۳ و ۴ برای ۴۵ روز رژیم پرکلسترول ۱٪ و پس از آن رژیم معمولی و رژیم معمولی + عصاره راعی (۱۵۰ mg/kg.bw) به ترتیب به مدت ۳۰ روز دریافت نمودند (دوره رگرسیون). نمونه خون در ابتدا، ۴۵ روز و بعد از ۷۵ روز به ترتیب رژیم غذایی جمع‌آوری گردید.

یافته‌ها: در پایان فاکتورهای بیوشیمیایی سرم (apoB, MDA, OX-LDL) در گروه III و IV کاهش یافته بود. ولی میزان فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در گروه IV در مقایسه با گروه III کاهش بیشتری یافته بود.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که ترکیبات پلی فنلیک مشتق شده از گیاه راعی احتمالاً در کاهش لیپیدهای سرم و درمان تغییرات آترواسکلرزوی نقش دارند.

کلید واژه‌ها: آترواسکلرزو، درمان، راعی، خرگوش، آپولیپوپروتئین

مقدمه

مونوکوتی‌ها و سلول‌های T می‌شود و موجب تغییر ماکروفازها و مهاجرت به لایه‌های زیرین آندوتیال شده و در مرحله بعد- LDL بوسیله گیرندهای جمع‌کننده جذب شده و منجر به تشکیل سلول‌های کف‌آلود و تشکیل رگه‌های چربی می‌شود (۱ و ۲). از دیگر پارامترهایی که با بیماری‌های قلبی- عروقی ارتباط دارند آپولیپوپروتئینها می‌باشند که از مهمترین اجزاء لیپوپروتئینها می‌باشند یک شاخص مهم در پیش‌بینی بیماری‌های قلبی عروقی بشمار می‌روند (۳). افزایش سطح آپولیپوپروتئین B و لیپوپروتئینها مانند VLDL، LDL، VLDL، LDL، A تحریک کننده چرخه التهاب

آترواسکلرزو یک پروسه پیچیده شامل اکسیداسیون لیپیدها است و التهاب نقش اساسی در پیشرفت آترواسکلرزو دارد (۱). اگرچه مکانیسم التهابی آتروژن هنوز به درستی مشخص نیست و نیاز به تحقیقات بیشتری دارد ولی افزایش آپولیپوپروتئین B (apoB) و لیپوپروتئینها مانند LDL و VLDL و لیپوپروتئین B (Lp(a)) نقش مهمی در تحریک چرخه التهاب دارد (۲). افزایش فشارهای اکسیداتیو منجر به افزایش تولید Reactive oxygen species (ROS) و درنتیجه التهاب و آترواسکلرزو می‌شود. Oxidized species و درنتیجه التهاب و آترواسکلرزو می‌شود. low-density lipoprotein (ox-LDL) سبب جذب

آمده از آخرین مرحله درون ظرفی ریخته شد و تحت دمای ۵۰ درجه سانتی گراد و شرایط سترون شده خشک گردید. پودر خشک از آخرین مرحله بدست آمده در بطری شیشه ای تیره در ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شد (۱۰).

گروه بندی و تیمار خرگوشها

در یک مطالعه تجربی ۲۰ خرگوش نر بالغ از نژاد نیوزیلندی با وزن متوسط ۱۷۰۰-۲۰۰۰g از موسسه رازی کرج خریداری و به لانه حیوانات دانشکده علوم انتقال یافته‌اند. به منظور تطابق با محیط، خرگوش‌ها به مدت دو هفته تحت رژیم پایه و شرایط استاندارد از لحظه نور (۲ ساعت نور ۱۲ ساعت تاریکی)، رطوبت نسبی (۴۰-۷۰ درصد) و درجه حرارت (دماه ۲۳±۲ درجه سانتی گراد) نگهداری شدند. در این مدت با رژیم استاندارد Super Foskkorn تهیه شده از استیتو پاستور تغذیه شدند (هر ۱۰۰۰ گرم از Super Foskkorn شامل ۱۴۰ گرم پروتئین، ۱۵۰ g فیبر و ۳۰ g گرم آب می‌باشد). سپس خرگوش‌ها به طور تصادفی در ۴ گروه ۵ تایی تقسیم شدند. گروه اول با رژیم غذایی استاندارد به مدت ۷۵ روز، گروه دوم با رژیم پرکلسترول (کلسترول یک درصد وزن غذا) به مدت ۷۵ روز، گروه ۳ و ۴ برای ۴۵ روز رژیم پرکلسترول ۱٪ و پس از آن بترتیب در گروه سوم رژیم معمولی و گروه چهارم رژیم معمولی + عصاره راعی (۱۵۰mg/kg.bw) به مدت ۳۰ روز دریافت نمودند. وزن بدن قبل از شروع درمان و هر ۱۵ روز یکبار اندازه گیری شد.

اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی

قبل از شروع مطالعه، ۳۰ و ۴۵ روز خرگوش‌ها برای ۱۲ ساعت در حالت ناشتا قرار گرفته‌اند. سپس نمونه خون از رگ میانی گوش جهت بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی گرفته شد. نمونه خون در ۲۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۵ دقیقه سانتریفوژ شد. غلاظت سرمی آپولیپوپروتئین A با کیت پارس آزمون و دستگاه ۹۰۲ Hitachi به روشن ایمنوتوریلودمتری تعیین شد. مالون دی آلدید نیز با روش اسپکتروفوتومتریک و OX-LDL MDA و آپولیپوپروتئین B افزایش آپولیپوپروتئین A در خرگوشها هایپرکلسترولی و به طور کلی اثر این عصاره در کاهش فشارهای اکسیداتیو بررسی شده است.

مواد و روش‌ها

آماده سازی گیاه


گیاه گل راعی از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان تهیه و جنس و گونه این گیاه توسط گیاه شناس هریاریوم دانشکده علوم اصفهان مورد تایید قرار گرفت. نمونه در هریاریوم دانشگاه اصفهان با شماره ۱۳۶۴۸ ذخیره شده است.

تهیه عصاره هیدروالکلی

بخش‌های هوایی، گیاه به مدت ۱۰ روز در دمای اتاق خشک گردید و به صورت پودر در آورده شد. سپس ۱۰۰ گرم از پودر گیاه گل راعی در اتانول ۹۶٪ به مدت ۷۲ ساعت خیس شد و پس از فیلتر کردن، توسط دستگاه تقطیر در خلاء تغليظ گردید. محلول غلیظ شده در سه مرحله (یک بار با ۱۰۰ میلی لیتر و دو بار با ۵۰ میلی لیتر کلروفرم) دکانته شد. محلول بدست

آنالیز آماری

نتایج به صورت Mean ± SD مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. برای بررسی نتایج بیوشیمیایی و مقایسه میانگین گروههای آزمایشی از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس ANOVA استفاده شد، $p < 0.05$ معنی دار تلقی گردید. کلیه نمودارهای مربوط نیز، در برنامه نرم‌افزاری Excel رسم شد.



نمودار ۱: تغییرات فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در ۴ گروه در ابتدا، ۴۵ روز و ۷۵ روز

گروه اول: گروه نرمال تیمار شده با رژیم معمولی مدت ۷۵ روز
 گروه دوم: گروه تیمار شده با رژیم پر کلسترول ۱٪ به مدت ۷۵ روز
 گروه سوم: گروه تیمار شده با رژیم پر کلسترول ۱٪ به مدت ۴۵ روز و سپس رژیم معمولی به مدت ۳۰ روز
 گروه چهارم: گروه تیمار شده با رژیم پر کلسترول ۱٪ به مدت ۴۵ روز سپس عصاره راعی (۱۵۰ mg/kg.bw) به مدت ۳۰ روز (p<0.05)
 a معنی دار بودن بین گروههای تیمار شده با رژیم معمولی III و گروه تیمار شده با عصاره راعی IV نسبت به گروه II بعد از ۷۵ روز
 b معنی دار بودن بین گروه تیمار شده با عصاره راعی IV نسبت به گروه III بعد از ۷۵ روز
 هر ستون انحراف معیار ± میانگین (Mean±SD) را نشان می دهد.

یافته ها

میزان فلاونوئیدها و آنتوسبیانین ها

به ازای هر ۱۰۰ گرم پودر گیاه گل راعی به طور متوسط 0.033 ± 0.033 گرم پودر عصاره هیدروالکلی گل راعی بدست آمد. تابیج نشان داد که میزان فلاونوئیدهای موجود در گل راعی 0.0031 ± 0.0031 درصد فلاونول بر مبنای هیبروزید می باشد. میزان آنتوسبیانین های موجود در گل راعی 2.299 ± 0.99 آنتوسبیانین های تام mg در ۱۰۰ گرم نمونه می باشد.

فاکتورهای بیوشیمیایی

در ابتدای دوره در میانگین فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در بین گروههای مورد مطالعه تغییر معنی داری وجود نداشت (نمودار ۱). در گروههای دارای رژیم پر کلسترول (گروه II, III, IV) بعد از ۴۵ روز و گروه II بعد از ۷۵ روز افزایش معنی داری ($P < 0.05$) در میزان apoB, apoA و OX-LDL میزان آنتوسبیانین های در مقایسه با گروه I و ابتدای دوره نشان داد (نمودار ۱). در گروه دارای رژیم

ترکیبات فنلی با فعالیت آنتیاکسیدانی نقش مهمی در جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدها دارند (۲۰). Hakimoglu و همکاران در Hypericum ۲۰۰۷ در مطالعه‌ای نشان دادند که عصاره اتانولی *lismachioides* (*HL*) موجب کاهش سطح کلسترول و LDL در خرگوش‌هایی که بعد از ۵ هفته تیمار با *HL* همراه با رژیم پرکلسترول دریافت کردند، گردید و همچنین سبب افزایش سطح HDL در مقایسه با گروه تیمار شده با کلسترول شد (۲۱). نتایج مطالعه ZOU et al در ۲۰۰۵ نشان داد که سطح کلسترول، LDL، TG، در گروهی که رژیم پرکلسترول به همراه عصاره فلاونوئیدی راعی (HP) دریافت کرده بودند، در مقایسه با گروه تیمار شده با کلسترول کاهش یافته بود و سطح HDL افزایش یافته بود. کاهش در میزان کلسترول که بوسیله عصاره ایجاد می‌شود احتمالاً "بوسیله اثر بازدارنده‌گی فعالیت HMG COA" یا افزایش دفع اسیدهای صفراء و کلسترول است (۲۲). در مطالعه‌ای که بر روی گنگ فرنگی انجام شد مشخص شد که این گیاه موجب رگرسیون ضایعات آترواسکلروز می‌شوند (Boban ۲۳). و همکارانش در اثر فیر موجود در شبیله را در کاهش پلاک آترواسکلروزی و توانایی در کاهش ضایعات آترواسکلروزی را در خرگوش‌های هایپرکلسترولمی بوسیله بررسی لیپیدهای سرمی و هیستولوژی نشان دادند. این نتایج نشان داد که شبیله دارای اثر آنتی آتروژنیک است و منجر به تسریع رگرسیون ضایعات آترواسکلروز در آئورت شده و به عنوان یک ماده غذایی می‌تواند در کاهش پیشرفت آترواسکلروز موثر باشد (۲۴).

در این مطالعه مشخص شد عصاره هیدرولکلی گیاه راعی موجب کاهش سطح apoB OX-LDL و MDA در خون می‌شود. با توجه به اینکه MDA شاخص مهمی در ارزیابی فشارهای اکسیداتیو می‌باشد، بنابراین این مطالعه نشان می‌دهد که عصاره هیدرولکلی راعی دارای اثر آنتی اکسیدانی بوده و احتمالاً در کاهش ضایعات آترواسکلروزی موثر می‌باشد. مکانیسم‌هایی که این گیاه موجب کاهش این فاکتورهای بیوشیمیایی می‌شود هنوز مشخص نیست و نیاز به تحقیقات بیشتر و استفاده از مدل‌های دیگر به ویژه انسانی دارد.

تقدیر و تشکر

تحقیق حاضر قسمتی از طرح تحقیقاتی شماره ۸۴۱۴۱ مصوب مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان می‌باشد و قسمتی به صورت پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه اصفهان انجام گرفته است. بدین وسیله از کادر محترم آزمایشگاه مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان جهت انجام آزمایشات بیوشیمیایی و همچنین خانم دکتر پروین محزونی قدردانی می‌شود.

پرکلسترول (گروه II) بعد از ۷۵ روز افزایش معنی‌داری ($P < 0.05$) در میزان apoA و OX-LDL، MDA و apoB در مقایسه با گروه I و ابتدای دوره نشان داد (نمودار ۱). همچنین OX-LDL، MDA apoB در گروه III و IV در افزایش معنی‌داری ($P < 0.05$) در میزان apoA در گروه apoB در میزان apoB در پایان دوره وجود داشت (نمودار ۱). میزان apoB در ۷۷/۲۶۹۴ (۳۱/۴±۷/۳۰۰۶)، OX-LDL، LDL و apoB در ۰/۲۸±۰/۱۷۸۸ (۴۰/۳±۵/۰۳۳۲) در گروه IV در طی دوره درمان بعد از ۷۵ روز در مقایسه با میزان apoB (۰/۷۵۸۸) در گروه III کاهش معنی‌داری ($P < 0.05$) نشان داد، همچنین میزان apoA در ۰/۷۵۸۸ و III ($P < 0.05$) در گروه apoA در ۰/۵۶۷۶ (۳۵/۶±۲/۶۰۷۶) و گروه III افزایش معنی‌داری ($P < 0.05$) داشته است (نمودار ۱).

بحث

مطالعه حاضر نشان داده است که رژیم غذایی، با کلسترول بالا (٪۱۰) در طی ۴۵ روز منجر به افزایش سطح apoA، apoB و OX-LDL MDA در خرگوشها می‌شود. نتایج در این تحقیق نشان داد که عصاره هیدرولکلی راعی به طور معنی‌داری دارای اثر آنتی اکسیدانی می‌باشد، بدلیل اینکه عصاره در طی دوره رگرسیون منجر به کاهش سطح OX-LDL MDA و apoB می‌شود. اخیراً مشخص شده که آنتوسیانین‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای دارای فعالیت آنتی اکسیدانی می‌باشد (۱۱). مشخص شده که آنتوسیانین‌ها رادیکال‌های اکسیژن را در پلاسمما و مایع میان بافتی دیواره عروق به دام انداخته و از اکسیداسیون LDL جلوگیری می‌کند (۱۲). رژیم معمولی به دنبال رژیم پرکلسترول در مقایسه با عصاره راعی توانسته سطح MDA را کاهش دهد. افزایش سطح MDA همراه با افزایش سطح فشارهای اکسیداتیو می‌باشد (۶). آتروژن با افزایش در پراکسیداسیون لیپیدها و تولید MDA که یک شاخص مهم برای ROS می‌باشد، و کاهش سطح MDA فعالیت آنتی اکسیدانی ارتباط دارد (۱۳). آنتی اکسیدانها و ترکیبات که فعالیت ROS را متوقف می‌کنند اثر موثری در توقف پیشرفت آترواسکلروز دارند (۶). اخیراً مشخص شده که آپولیپوپرٹینهای به ویژه آپولیپوپرٹین B نقش مهمی در بیماریهای قلبی عروقی دارند (۱۴-۱۵). اخیراً مطالعات نشان داده است که فلاونوئیدها منجر به کاهش ترشح apoB در کبد می‌شوند اثر هایپوکلسترولمیک این ترکیبات در ارتباط با کاهش HMG-CoA در کبد و فعالیت ACAT می‌باشد (۱۶-۱۷). مکانیسم‌هایی که به کندی موجب کاهش پیشرفت و رگرسیون آترواسکلروز می‌شوند، احتمالاً "با کاهش فشارهای اکسیداتیو می‌باشد و مطالعات نشان داده است که ترکیبات آنتی اکسیدانی فنلی نقش مهمی در کاهش بیماری‌های قلبی عروقی و جلوگیری از آترواسکلروز دارند (۱۸-۱۹). تحقیقات نشان داده است که

References

- Güldiken S, Demir M, Arıkan E, Tuğrul A. The Level of Serum High Sensitive C-reactive protein in Women with Hyperthyroidism. *Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism* 2005; **3**: 85-88.
- Fan J, Watanabe T. Inflammatory reactions in the pathogenesis of atherosclerosis. *J Atherosclerosis Thromb* 2003; **10**(2): 63-71.
- Libby P, Aikawa M. Stabilization of atherosclerotic plaques: new mechanisms and clinical targets. *Nat Med* 2002; **8**: 1257-1262.
- Genest J Jr, McNamara JR, Ordovas JM, Jenner JL, Silberman SR, Anderson KM. Lipoprotein cholesterol, Apo lipoprotein A-I and B and lipoprotein (a) abnormalities in men with premature coronary artery disease. *J Am Coll Cardiol* 1992; **19**(4): 792-802.
- Walldius G, Jungner I. Apolipoprotein B and apolipoprotein A-I: risk indicators of coronary heart disease and targets for lipid-modifying therapy. *J Intern Med* 2004; **255**(2): 188-205.
- Prasad K. Regression of hypercholesterolemia atherosclerosis in rabbits by secoisolaricresinol diglucoside isolated from flaxseed. *Atherosclerosis* 2008; **197**: 34-42.
- Samsam Shariat H. *Medicinal plants grow and reproduce*. Tehran, Mani Pub, 1995; PP: 420 (Persian).
- Ghasemi Dehkordi N. *Iranian herbal pharmacopren*. Tehran, Ministry of Health Pub, 2002; PP: 360-400 (Persian).
- Zou Y, Lu Y, Wei D. Antioxidant activity of a flavonoid-rich extract of *Hypercom Perforatum L.* in vitro. *J Agric Food Chem* 2004; **52**: 5032-5039.
- Eseyin O, Ebong P, Igboasoyi A, Oforah E. Hypoglycemic effect of the seed extract of *Telfairia occidentalis* in rat. *Pakistan Journal of Biological Sciences* 2007; **10**(3): 498-501.
- Wang Q, Han P, Zhang M, Xia M, Huilian Zhu H, Ma J, Hou M. Supplementation of black rice pigment fraction improves antioxidant and anti-inflammatory status in patients with coronary heart disease. *Asia Pac J Clin Nutr* 2007; **16**: 295-301.
- Yamakoshi J, Kawaka S, Koga T, Arial T. Proanthocyanidin-rich extract from grape seeds attenuates the development of aortic atherosclerosis in cholesterol-fed rabbits. *Atherosclerosis* 1999; **142**(1): 139-149.
- Lee P, Prasad K. Suppression of oxidative stress as a mechanism of reduction of hypercholesterolemia atherosclerosis by cyclooxygenase inhibitor in rabbits. *In. J Angiol* 2003; **12**: 13-23.
- Sacks FM. The Apo lipoprotein story. *Atherosclerosis* 2006; **7**: 23-27.
- Walldius G, Jungner I. The apoB/apoA-I ratio: a strong, new risk factor for cardiovascular disease and a target for lipid-lowering therapy—a review of the evidence. *J Intern Med* 2006; **259**: 493-519.
- Borradaile NM, Dreu LE, Barrett P.H.R, Huff MW. Inhibition of hepatocyte apoB secretion by naringenin. *Enhanced rapid intracellular degradation independent of reduced microsomal cholesteryl esters* 2002; **43**: 1144-1154.
- Pignatelli P, Santo SD, Buchetti B, Sanguigni V, Brunelli A, Violi F. 2008. Polyphenols enhance platelet nitric oxide by inhibiting protein kinase C-dependent NADPH oxidase activation: effect on platelet recruitment. *FASEB J* 2006; **20**: 1082-1089.
- Di MatteoV, Esposito E. Biochemical and therapeutic effects of antioxidants in the treatment of Alzheimer's disease, Parkinson's disease and amyotrophic lateral sclerosis. *Curr Drug Targets: CNS Neurol Disord* 2003; **2**: 95-107.
- Gerber M, Boutron-Rault MC, Hereberg S, Riboli E, Scalbert A, Siess MH. Food and cancer: state of the art about the protective effect of fruits and vegetables. *Bull Cancer* 2002; **89**: 293-312.
- Yen GC, Duh PD, Tsai CL. The relationship between antioxidant activity and maturity of peanut hulls. *J Agric Food Chem* 1993; **41**: 67-70.
- Hakimoglu F, Kizil G, Kanay Z, Kizil M, Isi H. The effect of ethanol extract of *Hypercom lysimachioides* on lipid profile in hypercholesterolemia rabbits and its in vitro antioxidant activity. *Atherosclerosis* 2007; **192**: 113-122.
- Zou Y, Lu Y, Wei D. Hypercholesterolemic effects of a flavonoid-rich extract of *Hypercom perforatum L.* in rats fed a cholesterol-rich diet. *J Agric Food Chem* 2005; **53**: 2462-2466.
- Asgary S, Dinani NJ, Madani H, Mahzouni P. Ethanolic extract of *Artemisia aucheri* induces regression of aorta wall fatty streaks in hypercholesterolemic rabbits. *Pharmazie* 2008; **63**(5): 394-397.
- Boban PT, Nambisan B, Sudhakaran PR. Dietary mucilage promotes regression of atheromatous lesions in hypercholesterolemia rabbits. *Phytother Res* 2008; **23**: 725-730.