

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوره ۳۴ شماره ۵ آذر و دی ۱۳۹۱ صفحات ۸۶-۷۹

اثر IgY ایجاد شده بواسیله DNA واکسن علیه آلووده به هلیکوباکتر پیلوری

زبیا ویسی ملکشاهی: گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

سید لطیف موسوی گرگری: گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران، نویسنده رابط:

E-mail: Slmousavi@shahed.ac.ir

علی هاتف سلمانیان: پژوهشکده زیست فناوری گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

ولید ابراهیمی زاده: گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

شقایق امیری جاوید: واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد، تهران، ایران

دریافت: ۹۱/۱/۲۰ پذیرش: ۹۱/۴/۱۷

چکیده

زمینه و اهداف: هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری گرم منفی مارپیچی شکل می‌باشد که با استقرار و تکثیر در لایه مخاطی معده انسان ایجاد عفونت می‌نماید. این عفونت می‌تواند منجر به التهاب مزمن، زخم‌های معده و دوازده‌ه می‌گردد. تحقیق برای یافتن روش‌های جدید درمان به سبب ایجاد مقاومت روز افزون باکتری به آنتی‌بیوتیک‌ها گسترده‌تر می‌شود. هدف از مطالعه حاضر برسی اثر IgY تولید شده بواسیله DNA واکسن حاوی ژن بیان کننده زیر واحد UreC از آنژیم اوره آز هلیکوباکتر پیلوری در موش‌های آلووده شده با باکتری هلیکوباکتر پیلوری می‌باشد.

مواد و روش‌ها: تعداد 10^9 باکتری (در 1 ml 400 محیط کشت بروسلا براث) به بعد موش‌های $\text{C57BL}/6\text{j}\text{C}3$ بار به فاصله یک روز در میان گاواج شد. به موش‌های شاهد نیز 1 ml 400 محیط کشت استریل خورانده شد. هشت هفته پس از آخرین تلقیح از موشها خونگیری شد و میزان آلوودگی بواسیله ELISA ارزیابی گردید. شدت التهاب معده توسط تست پاتولوژیکی بررسی شد. موش‌های آلووده به مدت 28 روز توسط 60 mg IgY جدا شده از زردۀ تخم مرغ از مرغ‌های این شده بواسیله واکسن DNA ای مورد تیمار قرار گرفتند.

یافته‌ها: نتایج ELISA نشان دهنده ایجاد آلوودگی موش‌ها به میزان 53% بود. نتایج پاتولوژی وجود التهاب در معده موش‌های آلووده را تایید کرد. کاهش معنی داری در تیتر آنتی بادی موش‌های آلووده و تیمار شده با IgY در مقایسه با موش‌های آلووده و تیمار نشده، دیده شد.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که IgY تولید شده می‌تواند در کاهش التهاب در مدل موشی موثر باشد.

کلید واژه‌ها: هلیکوباکتر پیلوری، IgY ، DNA واکسن، التهاب

مقدمه

اپیدمیولوژی و آماری نشان می‌دهد که نیمی از جمعیت جهان آلووده به هلیکوباکتر پیلوری می‌باشند (۲). برای درمان عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری از رژیم‌های درمانی متداول که شامل مترونیدازول، آموکسی سیلین، کلاریتروماپایسین و بازدارنده پمپ پروتونی یا بیسموت است، استفاده می‌شود (۳). استفاده از چند

هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری گرم منفی و مارپیچی شکل می‌باشد که محل استقرار و تکثیر آن در لایه مخاطی معده انسان است. این لانه گزینی موجب بروز عفونت و در بی آن تحریب بافت اپیتلیال معده می‌شود که در صورت عدم درمان مناسب سبب التهاب مزمن، زخم‌های معده و دوازده‌ه می‌گردد (۱). بررسیهای

سفیده جدا شد. پس از شستشو بوسیله آب مقطر و جدا نمودن کیسه زرده، دو برابر حجم زرده به آن بافر سدیم فسفات ۱۰ میلی مولار با $\text{PH}=7/6$ اضافه کرده و به طور کامل مخلوط شد. به مخلوط فوق $۶۰۰۰\text{ mg}/۳/۵\text{ PEG}$ با نسبت وزن به حجم اضافه گردید و به کمک هم زن مغناطیسی به خوبی مخلوط گردید تا محلولی کاملاً یکنواخت بدست آید. پس از ۶۰ دقیقه نگهداری در دمای آزمایشگاه بوسیله سانتریفیوز (۴۵°C) محلول رویی که حاوی لیپوپروتئین بوده جدا گردید و به رسوب حاصل، بافر فسفات حاوی ۱۲ % PEG اضافه شد. بعد از ۲۰ دقیقه مخلوط کردن، محلول به مدت ۱۵ دقیقه در ۲۰۰۰ g سانتریفیوز شد و رسوب به روی کاغذ صافی متقل گردید و به مدت یک ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد نگهداری شد. سپس رسوب باقی مانده بر روی فیلتر در بافر فسفات حل گردید و پس از تعیین غلظت پروتئین با روش برادفورد، در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شد. IgY از دست آمده از فرایند جداسازی، با استفاده از SDS-PAGE مورد بررسی قرار گرفت (۱۷).

کشت باکتری هلیکوپاکتر پیلوری

نمونه های جدنشده باکتری هلیکوپاکتر پیلوری از بیماران ایرانی (دانشکده بهداشت دانشگاه تهران)، در محیط بروسلا آگار حاوی خون دفیرینه گوسفندي ($5/5$) و سرم جنین گوساله ($7/7$) و محلول مکمل کمپیلوباکتر (Merck) که دارای ونکومایسین، تری متیپریم و پلی میکسین B بود، و مواد ضد باکتری و قارچ کشت داده شد. پلیت ها به همراه گاز پک میکروآئروفیلیک C درون جار به مدت 7 روز در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد نگهداری شدند. پس از گذشت 7 روز، نمونه ها از جار خارج و در صوت مشاهده کلونی، آزمایش های تشخیصی (تست اوره آز، کاتالاز، اکسیداز) و رنگ آمیزی گرم انجام گردید (۱۸).

نحوه آلوود سازی موش ها توسط هلیکوپاکتر پیلوری

تعداد ۴۱ سر موش نژاد $6/6$ C57BL از موسسه انتستیتو پاستور ایران خریداری شد و در ۶ گروه تست، هر گروه شامل 6 سر موش و 1 گروه شاهد (5 سر موش) تقسیم بندی شد. تقسیم بندی موش ها در شش گروه تست تنها به دلیل کترل بهتر بوده و روش تیمار و نگهداری همگی یکسان بود. پس از رشد باکتری ها در محیط بروسلا براث حاوی مواد مکمل، تعداد باکتری ها در هر میلی لیتر محیط کشت شمارش و سپس تعداد ۱۰^9 باکتری (در حجم ۴۰۰ میکرولیتر) به معده هر موش، ۳ بار به فاصله یک روز در میان گاواج (gavage) شد. به موش های شاهد نیز تحت همین شرایط ۴۰۰ میکرو لیتر محیط کشت استریل خورانده شد. قبل از تلقیح باکتری به معده موش ها، موش ها به مدت یک شبانه روز در حالت گرسنگی قرار داده شدند. 6 ساعت بعد از تلقیح باکتری نیز به موش ها آب و غذا داده نمی شد. کلیه آزمایشات حیوانی بر اساس مقررات اخلاقی کار با حیوانات دانشگاه شاهد انجام پذیرفت.

آنثی بیوتیک به طور همزمان از یک طرف و مقاومت باکتری به آنثی بیوتیک ها از طرف دیگر پروسه درمان را حداقل در $۲۰-۴۰\%$ از بیماران با مشکل مواجه ساخته است (۴). یکی از راه های موثر در پروسه درمان استفاده از آنتی بادی های اختصاصی می باشد. در حال حاضر کاربرد آنتی بادی ها در درمان عفونت ناشی از باکتری ها در حال افزایش است (۵). علاوه بر آن مشخص شده است که ایجاد اینمی اکتسابی از طریق خوراندن آنتی بادی ها می تواند در پیشگیری و یا درمان عفونت بسیاری از پاتوژن های دستگاه گوارشی موثر باشد (۶-۸). استفاده از آنتی بادی های تخلیص شده از زرده تخم مرغ های، مرغ های اینمن شده علیه آنتی زن های اصلی هلیکوپاکتر پیلوری، تاثیر فراوانی در کترل و درمان عفونت های ناشی از هلیکوپاکتر پیلوری داشته است (۹). همچنین مطالعات نشان می دهند که آنتی بادی های تولید شده علیه هلیکوپاکتر پیلوری در شیر گاو می تواند در درمان عفونت ناشی از هلیکوپاکتر پیلوری در مدل های موشی موثر باشد (۱۰-۱۱). آنزیم اوره آز هلیکوپاکتر پیلوری اصلی ترین پروتئین به عنوان ایمونوژن در مقایسه با دیگر پروتئین های این ارگانیسم می باشد. بنابراین این آنتی زن می تواند یکی از بهترین کاندیدها برای تهیه واکسن یا آنتی بادی علیه هلیکوپاکتر پیلوری باشد (۱۲-۱۳). فعالیت اوره آز از یک طرف باعث بقاء باکتری در شرایط اسیدی معده و از طرف دیگر سبب ایجاد صدمات بافتی در بافت پوششی معده می شود. همچنین گزارشات بیانگر این است که باکتری بدnon توانیت اوره آزی قادر به ایجاد عفونت در معده انسان نمی باشد (۱۴). با اینکه نقش اینمی اکتسابی در درمان عفونت هلیکوپاکتر پیلوری ناشناخته می باشد، اما تحقیقات نشان داده اند که آنتی بادی های خاصی می توانند در برابر عفونت هلیکوپاکتر پیلوری محافظت کنند باشند (۱۴). اخیرا استفاده از مدل های حیوانی برای نشان دادن ایجاد مصنوبیت به کمک آنتی بادی ایجاد شده علیه آنتی زن نوترکیب و طبیعی هلیکوپاکتر پیلوری مورد توجه قرار گرفته است که می تواند برای درمان عفونت های هلیکوپاکتر پیلوری مورد استفاده قرار گیرد (۱۵-۱۹). تحقیقات قبلی گروه ما نشان داد که تزریق پلاسمید pCI حاوی زن ($pCI-ureC$) که یکی از زیر واحد های مهم آنزیم اوره آز هلیکوپاکتر پیلوری می باشد، می تواند سبب تولید آنتی بادی IgY در زرده تخم مرغ علیه آنزیم اوره آز باکتری هلیکوپاکتر پیلوری شود. این آنتی بادی توanst آنزیم اوره آز تولید شده توسط هلیکوپاکتر پیلوری را در محیط کشت خشی کند (۱۶). در تحقیق حاضر بر آن شدیم که در اقدامی فراتر، تاثیر این آنتی بادی در مهار رشد باکتری در معده موش های آلوود شده با هلیکوپاکتر پیلوری و کاهش التهاب ناشی از رشد این باکتری را مورد بررسی قرار دهیم.

مواد و روش ها

جداسازی IgY از زرده تخم مرغ
آنثی بادی IgY به روش واکسن اسید نوکلیکی مطابق با روش قبلی القا گردید (۲۰). جهت تخلیص IgG ابتدا زرده تخم مرغ از

مورد تیمار قرار گرفتند. لازم به ذکر است که ۲ ساعت قبل و ۶ ساعت بعد از هر تلقیح، به موش‌ها آب و غذا داده نمی‌شد. پس از اتمام ۲۸ روز دوره تیمار، به موش‌ها به مدت ۱۰ هفته استراحت داده شده و سپس جهت بررسی تاثیر آنتی بادی IgY تولید شده علیه اوره آز، از موش‌های گروه آزمایش (موش‌های آلوده شده توسط هلیکوپاکتر پیلوری و تیمار شده توسط IgY)، موش‌های گروه کنترل مثبت (موش‌های آلوده شده توسط هلیکوپاکتر پیلوری و تیمار نشده توسط IgY) و موش‌های گروه منفی (موش‌هایی که مورد هیچ گونه تیماری قرار نگرفته بودند) خون‌گیری صورت گرفت و سرم آنها جداسازی گردید و توسط روش الیزا مورد بررسی قرار گرفت. همانند مرحله قبل ناحیه آنتروم معده تعدادی از موش‌های تیمار شده جدا گردید و در فرمالدھید ۱۰ درصد برای آزمایشات پاتولوژی ارسال شدند.

روش‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق
جهت آنالیز داده‌های بدست آمده از (Paired, T-test (Unpaired و P-value Graphpad Prism (تست فیشر) و نرم افزار استفاده شد.

یافته‌ها

تخلیص ایمونوگلوبولین از تخم مرغ

محصول به دست آمده از فرایند جداسازی ایمونوگلوبولین مرغی از زردۀ تخم مرغ های به دست آمده با استفاده از SDS-PAGE مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی برای اطمینان از حضور ایمونوگلوبولین در مخلوط پروتئینی تخلیص شده، نمونه مربوط به صورت جداگانه بوسیله بافرهای حاوی 2ME و فاقد آن بر روی ژل پلی آکریل آمید الکتروفورز شد. در شکل ۱، ستون ۱ مربوط به نمونه با بافر فاقد 2ME می‌باشد، باند ایمونوگلوبولین کامل، حاوی پیوند دی سولفیدی با اندازه تقریبی ۱۶۵ کیلو Daltonی مشخص است، در حالی که در ستون ۲ و ۳ از بافر حاوی 2ME استفاده شده که باعث باز شدن پیوندهای دی سولفیدی و جدائی زنجیره سبک و سنگین از یکدیگر شده است. همان طور که مشخص است زنجیره سنگین روپروی مارکر ۶۱ کیلو Daltonی و زنجیره سبک در حدود روپروی مارکر ۳۰ کیلو Daltonی قرار گرفته‌اند.

نتایج الیزای موش‌های آلوده، آلوده تیمار شده با IgY و شاهد
نمودار شماره ۱ نشان دهنده میزان تیتر آنتی بادی تولید شده در موش‌های گروه آزمایش پس از آلودگی آن‌ها بوسیله هلیکوپاکتر پیلوری می‌باشد. همان‌گونه که در نمودار مشخص می‌باشد میزان آنتی بادی های تولید شده علیه باکتری در سرم این گروه دارای تفاوت معنی‌داری با میزان تیتر آنتی بادی موجود در سرم گروه کنترل منفی ($P < 0.001$) می‌باشد.

نمودار شماره ۲ نتایج الیزای سرم موش‌های کنترل و آلوده قبل و بعد از مواجهه با IgY ضد اوره آز را نشان می‌دهد. کاهش معنی‌داری ($P < 0.001$) در میزان جذب نوری سرم موش‌های دریافت کننده IgY ضد اوره آز نسبت به سرم همان موش‌ها قبل

تست الیزا

به منظور بررسی آلودگی موش‌ها، هشت هفته پس از آخرین تلقیح، از ناحیه چشم موش‌ها خون‌گیری صورت گرفت و پس از جداسازی سرم از آن جهت ارزیابی تولید آنتی بادی ضد هلیکوپاکتر پیلوری با روش الیزای غیرمستقیم استفاده شد. به چاهک‌های پلیت الیزای ۹۶ چاهکی، ۲ میکروگرم پروتئین نوترکیب UreC به همراه ۱۰۰ میکرو لیتر بافر بی کربنات ۵۰ میلی مولار اضافه گردید و به مدت ۱۶ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری گردید. به منظور حذف مکان‌های پوشش نیافته توسط آنتی ژن، به چاهک‌ها محلول PBS حاوی ۰.۵٪ شیر خشک اضافه گردید و ۳۰ دقیقه در ۳۷ درجه سانتی گراد نگهداری شد. سریال رقت از سرم موش‌های ایمن شده و شاهد در چاهک‌های PBS-T تهیه گردید (محلول PBS حاوی ۰.۵٪ Tween-۲۰) و به میزان ۱۰۰ میکرو لیتر به هر چاهک اضافه گردید و سپس به مدت ۴۵ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد نگهداری شد. در مرحله بعد رقت مناسب (۱/۳۰۰۰) از آنتی بادی تولید شده علیه IgG موش کوژنروگه شده با آنزیم پراکسیداز (Congugate, from RAY Biotech) در بافر PBS-T تهیه و به هر چاهک ۱۰۰ میکرو لیتر اضافه شد. پس از ۴۵ دقیقه انکوباسیون در ۳۷ درجه سانتی گراد و شستشو بوسیله PBS-T به هر چاهک ۱۰۰ میکرو لیتر محلول سوسترا (۲ میلی گرم O-phenylenediamine Sigma-USA فسفات (pH=۵) که به آن ۰.۵ میکرو لیتر آب اکسیژنه ۰.۳٪ افزوده شد) اضافه و میکرو پلیت برای انجام واکنش به محل تاریک متقل شد. پس از ایجاد رنگ، واکنش توسط اسید سولفوریک ۰.۵٪ متوقف گردید و سپس جذب نوری در ۴۵۰ نانومتر خوانده شد.

تشخیص آلودگی با آزمایش پاتولوژی (آسیب شناسی)

پس از تایید آلوده شدن موش‌ها توسط تست الیزا، تعداد ۴ سر موش دارای واکنش الیزای مثبت به صورت اتفاقی انتخاب و ناحیه آنtronum معده آن‌ها جدا و در ظرف شیشه ای حاوی ۱۰ درصد فرمالدھید قرار داده شد. نمونه‌ها جهت بررسی‌های پاتولوژی به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ارسال شدند. پس از تایید آلودگی موش‌های مورد بررسی توسط آزمایش‌های پاتولوژی، موش‌های دارای الیزای مثبت به عنوان موش‌آلوده شده در نظر گرفته شدند و سپس به دو گروه کنترل مثبت و گروه آزمایش مورد تقسیم بندی قرار گرفتند. موش‌های کنترل مثبت شامل پنج سر بود و جهت اطمینان از پایداری عفونت هلیکوپاکتر پیلوری در نظر گرفته شدند و در طول تحقیق مورد تیمار دیگری قرار نگرفتند.

نحوه تلقیح آنتی بادی IgY به معده موش‌ها

موش‌های گروه آزمایش جهت بررسی اثر درمانی IgY تولید شده علیه اوره آز مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور هر موش به مدت ۲۸ روز و با میزان ۶۰ میلی گرم از IgY حل شده در ۵۰۰ میکرو لیتر PBS به صورت خوراکی و با گلواژ مستقیم به معده،


همچنین گسترش حفره های گوارشی و از بین رفتن اپیتیلیوم نشان دهنده آتروفی شدید این بافت ها می باشد (شکل ۲). پس از ۲۸ روز دوره درمانی توسط IgY ضد اوره آز تولید شده به روش DNA واکسن، بررسی های بافت شناسی نشان دهنده کاهش التهاب و ارتضاح کمتر لغفه سیت ها در زیر مخاط بافت اپیتیلیوم می باشد که بیان از توان IgY تولیدی در مهار کلونیزاسیون این باکتری می باشد (شکل ۲).

از شروع درمان وجود دارد. علاوه بر آن میانگین جذب نوری سرم موش های آلووده بعد از درمان تقریباً به سطح سرم موش های کنترل باز گشته است. کم بودن اختلاف بین میانگین دو گروه موش های کنترل و درمان شده با IgY تولید شده علیه اوره آز تائید کننده ($P < 0.05$) اثر مثبت در کنترل هلیکوباکتر پیلوری است.

نتایج بررسی های پاتولوژیکی گروه های مختلف موش ها


نتایج پاتولوژی معده موش های آلووده نشان داد که کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری در معده این موش ها صورت گرفته است.

بررسی میانگین تولید آنتی بادی در موش های آلووده و کنترل




نمودار ۱: بررسی میانگین تولید آنتی بادی در موش های آلووده و کنترل: بررسی آلدگی موش های تیمار شده توسط هلیکوباکتر پیلوری در مقایسه با موش های کنترل. میزان جذب نوری سرم موش های آزمایش در رفت های مختلف توسط علامت ■ موش های کنترل توسط علامت ♦ موش های آلووده شده نشان داده شده است.


بررسی روند درمان موش های آلووده در مقایسه با موش های کنترل



نمودار ۲: بررسی روند درمان موش های آلووده در مقایسه با موش های کنترل: مقایسه میانگین غلاظت آنتی بادی علیه UreC نوترکیب در سرم موش های آلووده شده توسط هلیکوباکتر پیلوری و تیمار نشده بوسیله IgY ♦ سرم موش های آلووده و تیمار شده با IgY تولید شده علیه ■ UreC و سرم موش های کنترل منفی ▲.



شکل ۱: آنالیز جداسازی ایمونوگلوبولین مرغی (IgY) از زرده تخم مرغ روی ژل SDS-PAGE ۹ درصد. ستون M اندازه مولکولی پروتئین، ستون ۱: محصول جداسازی IgY با فر بدون 2ME ستون ۲ و ۳: محصول جداسازی با فر حاوی 2ME



شکل ۲: بررسی بافت معده موش های C57BL/6j

شکل A: حضور سلول های ایمنی در بافت معده موش های آلوده شده به هلیکوپاکتر پیلوویری نشان دهنده گاستریت مزم من می باشد. نوتروفیل های درون بافت ابی تلیا و در سطح و غدد مخاطی نمایان می باشند و فولیکول ایجاد شده است. ارتashاج سلول های لغوفاپلاسموسینوئید شدید در زیر مخاط وجود دارد.

شکل B: حضور باکتری در سطح پوشش ابی تلیا و گردن غدد در رنگ آمیزی گیمسا مشخص می باشد. وجود باکتری های خمیده شکل بیانگر ایجاد عفونت و کلونیزاسیون هلیکوپاکتر پیلوویری در معده موش های تست می باشد. باکتری ها در شکل بوسیله پیکان نشان داده شده است (X1000).

شکل C: بررسی بافت معده موش های درمان شده بوسیله IgY-HpUc در این شکل ارتashاج نسبتا کمتر لتفویسیت ها در زیر مخاط وجود دارد که نشان دهنده درمان موش های آلوده توسط IgY-HpUc می باشد. (رنگ آمیزی گیمسا، یزر گرم نمایی X400)

بحث

از آنتی بادی ها به دلیل خصوصیات منحصر به فرد آنها از جمله اختصاصیت و عدم ایجاد مقاومت دارویی یکی از روش های جایگزین درمان های آنتی بیوتیکی می باشد. در اغلب موارد هزینه های سنگین ناشی از فرآیندهای تولید و تخلیص آنتی بادی ها مانع جهت استفاده گسترده آنها می باشد. استفاده از آنتی بادی های مشتق شده از زرده تخم به دلیل هزینه کم تولید، سهولت تخلیص و قابلیت استفاده آن ها در درمان بیماری های گوارشی می تواند روشی مناسب و تکمیل کننده درمان های آنتی بیوتیکی عفونت های ناشی از هلیکوپاکتر پیلوویری باشد. بر اساس بررسی های به عمل آمده یک میلی لیتر زرده تخم مرغ حاوی حدود ۵ میلی گرم IgY می باشد و با در نظر گرفتن حجم زرده تخم مرغ ۲۸ (۲۸ میلی لیتر) هر تخم مرغ می تواند حاوی ۱۴۰ میلی گرم IgY باشد. با توجه به اینکه هر مرغ در سال قادر به تولید حدود ۲۸۰

هیلیکوپاکتر پیلوویری مهمترین عامل ایجاد کننده زخم معده می باشد و طبق آمارهای متشر شده بیش از نیمی از جمعیت جهان مبتلا به این باکتری می باشند (۲۱). هلیکوپاکتر پیلوویری می تواند با استقرار در بخش آنتروم معده سبب عفونت طولانی مدت این ناحیه گردد (۱۹-۲۰). همچنین عفونت های طولانی مدت توسط این باکتری می تواند منجر به سرطان های گوارشی و ایجاد کارسینوما در این ناحیه شود (۲۰). در حال حاضر بیماری های ایجاد شده توسط هلیکوپاکتر پیلوویری توسط آنتی بیوتیک ها درمان می شوند. با توجه به افزایش روزافزوون سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک ها، چنین رویکرد درمانی در ۲۰ تا ۱۵ درصد موارد با شکست همراه می شود (۲۲). با توجه به گسترش سریع سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک، جایگزینی و یا به کارگیری یک سیستم کمکی همراه درمان های مبتنى بر آنتی بیوتیک در عفونت های ناشی از هلیکوپاکتر پیلوویری یک ضرورت به نظر می رسد. استفاده

بهترین مدل حیوانی جهت القای عفونت هلیکوپاکتر پیلوری در موش‌های نژاد Mongolian gerbils گزارش شده است (۲۶). علت انتخاب موش نژاد C57BL/6J در این مطالعه، عدم دسترسی به موش‌های نژاد جریبل در ایران و شباht فراوان این نژاد از موش به موش‌های جریبل بوده است (۲۸-۲۹). در این تحقیق موش‌های نژاد C57BL6/j پس از آلوود توسط هلیکوپاکتر پیلوری بواسیله IgY تولید شده به روش واکسن اسید نوکلئیکی مورد درمان قرار گرفتند. جهت اطمینان از درمان موش‌ها و کارآیی IgY ضد اوره آز در مهار و کاهش عفونت ناشی از هلیکوپاکتر پیلوری از تست‌های سروولوژیکی و پاتولوژیکی استفاده گردید. پاتولوژی تنها روش تشخیصی است که نه تنها حضور باکتری را در معده نشان می‌دهد، بلکه بیانگر میزان التهاب ناشی از عفونت نیز می‌باشد. علاوه بر این پاتولوژی اطلاعات مفیدی همانند تغییرات بافتی، ایجاد آتروفی مزمن و یا حاد را نشان می‌دهد. تلاش‌های صورت گرفته در جهت کلونیزه نمودن هلیکوپاکتر C57BL/6J Mongolian gerbils و C57BL/6J مشابه موش‌های Mongolian gerbils در معده نشان می‌دهد که ضایعات پاتولوژی به وجود آمده در معده موش‌های Mongolian gerbils می‌باشد (۲۳ و ۲۸). در این تحقیق همانند تحقیقات انجام شده قبلی بر روی مدل‌های Mongolian gerbils به وضوح مشخص شده است که IgY ضد اوره آز صدمات سطوح مخاطی معده ناشی از عفونت هلیکوپاکتر پیلوری را کاهش می‌دهد. بنابراین ارزش درمانی IgY و استفاده از آن به صورت خوارکی در مدل‌های حیوانی آزمایشگاهی همانند Mongolian gerbils به دلیل توانایی مهار اتصال باکتری‌ها می‌باشد (۳۰ و ۲۲ و ۹). با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق IgY می‌تواند سبب کاهش موثر التهاب ناشی از هلیکوپاکتر پیلوری شده و عوارض ناشی از عفونت توسط این باکتری را کاهش دهد. همچنین با توجه تولید آنتی‌بادی IgY به روش واکسن اسید نوکلئیک نشان داده‌ایم که واکسن‌های اسید نوکلئیک می‌توانند سبب ایجاد اینمی خونی موثر در میزان شده آنتی‌بادی‌هایی با کارآیی بالا را سبب شوند. استفاده از واکسن‌های مبتنی بر اسید نوکلئیک می‌تواند سبب کاهش چشمگیری در هزینه‌های تولید آنتی‌بادی شود و استفاده از آنتی‌بادی‌ها به همراه درمان‌های معمول از جمله درمان‌های آنتی‌یوتیکی می‌تواند منجر به درمان موثرتر و اختصاصی‌تر و از استفاده طولانی مدت آنتی‌بیوتیک‌ها و ایجاد سویه‌های مقاوم جلوگیری کند.

نتیجه گیری

ظهور سویه‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک هلیکوپاکتر پیلوری و همچنین هزینه بالای درمان از جمله مشکلات بیماری‌های ایجاد شده توسط این باکتری می‌باشد. یکی از مشکلات تولید این گونه آنتی‌بادی‌های منکولونال و نوترکیب تخلیص و بیان آنتی‌زن‌ها می‌باشد. تولید آنتی‌بادی به روش واکسن اسید نوکلئیک سبب حذف این مراحل و کاهش هزینه تولید می‌گردد. مهار عفونت توسط آنتی‌بادی تولید شده به روش اسید نوکلئیکی در مدل‌های موشی بیانگر کارآیی استفاده از روش واکسن اسید نوکلئیکی در

تخم مرغ است، این محاسبات حدود ۴۰ گرم IgY در ازای هر مرغ ایمن در سال را نشان می‌دهد (۲۳). اختصاصیت آنتی‌بادی تولیدی وابسته به ایمونوژن انتخاب شده جهت تولید آنتی‌بادی می‌باشد. گرچه استفاده از عصاره سلولی می‌تواند منجر به تولید آنتی‌بادی شود، ولی استفاده از آنتی‌زن‌های اختصاصی در روند تولید آنتی‌بادی سبب ایجاد آنتی‌بادی با اختصاصیت بالا نسبت به پاتوژن مورد نظر می‌گردد و از واکنش‌های متقاطع می‌کاهد. انتخاب UreC به عنوان ایمونوژن در این تحقیق به دلیل اهمیت بالای این زیر واحد در عملکرد آنزیم اوره آز هلیکوپاکتر پیلوری می‌باشد. تحقیقات نشان داده زیر واحد UreC یکی از بهترین کاندیدها جهت تولید واکسن‌های نوترکیب می‌باشد (۱۶). تولید پروتئین‌های نوترکیب و تخلیص آن‌ها از جمله مراحل پر هزینه تولید آنتی‌بادی‌ها می‌باشد (۹). استفاده از واکسن‌های مبتنی بر DNA می‌تواند سبب کاهش چشمگیر چنین فرآیندهایی شود. اخیرا نشان داده شده است که واکسن‌های مبتنی بر اسید‌های نوکلئیک علاوه بر ایجاد اینمی سلولی، می‌توانند سبب تحریک سلول‌های سیتوتوسیک T شده و همچنین اینمی خونی را تحریک کنند (۲۴). تحقیقات انجام شده نشان داده است که اینمی خونی ایجاد شده توسط واکسن‌های مبتنی بر اسید‌های نوکلئیک قابلیت محافظت کنندگی داشته و می‌تواند میزان را در برابر عفونت‌های بعدی محافظت کند (۲۴). واکسن‌های اسید نوکلئیکی به علت سهولت در تولید انبوہ پلاسمید نوترکیب و نیز افزایش مدت اینمی به علت بیان مداوم و طولانی مدت آنتی‌زن در بدن میزان، در مقایسه با تولید و تخلیص پروتئین نوترکیب سبب کاهش هزینه فرایند ایمن سازی و صرفه اقتصادی در تولید آنتی‌بادی اختصاصی می‌گردد.

در این مطالعه، به منظور دست‌یابی به روش‌های جایگزین آنتی‌بیوتیکی و همچنین جهت کاهش و درمان عفونت‌های گوارشی ناشی از هلیکوپاکتر پیلوری، اقدام به تولید آنتی‌بادی IgY توسط DNA ی زن ureC هلیکوپاکتر پیلوری و تخلیص آن از زرده تخم مرغ کردیم. نتایج تیتراسیون سرم منغه‌ای اینمی شده نشان داد که این شیوه اینمی سازی با تحریک موثر اینمی هومورال، سبب تولید آنتی‌C در مرغ گشته و با انتقال موفقیت‌آمیز آن به زرده تخم مرغ همراه بوده و این IgY می‌تواند فعالیت آنریمی اوره آز را در باکتری هلیکوپاکتر پیلوری نیز خشی نماید (۹ و ۲۱). تولید شده پس از تخلیص از زرده نشان داد، که فعالیت خود را طی مراحل کار کاهش نداده و توانسته است پتانسیل کاری خود را حفظ کند.

روش معمول جهت تخلیص IgY استفاده از کاراجنین و پلی‌اتیلن گلیکول می‌باشد و در این تحقیق از روش پلی‌اتیلن گلیکول با خلوص ۶۰٪ استفاده شد (۱۷). IgY تخلیص شده جهت درمان عفونت‌های موش‌های آلوود شده توسط هلیکوپاکتر پیلوری استفاده شد. هم اکنون جهت شیوه سازی عفونت‌های هلیکوپاکتر پیلوری از مدل‌های جبوانی نظری می‌باشد، سگ، خوک، گریه‌های خانگی و موش استفاده می‌شود، ولی استفاده از اغلب این حیوانات به دلیل عدم توانایی در نگهداری آسان، تعداد بالا و همچنین نسبت کم بروز عفونت، با محدودیت‌هایی همراه است (۲۵-۲۷).

و درمان جلوگیری خواهد کرد و تولید آن‌ها با هزینه پایین قابلیت استفاده از آن‌ها به عنوان ابزار پیشگیری به صورت افزودنی‌ها در مواد غذایی را فراهم می‌کند که گام بزرگی در مهار انتشار عفونت هلیکوبکتر پیلوری می‌باشد.

References

- Blaser MJ, Chyou P, Nomura A. Age at establishment of Helicobacter pylori infection and gastric carcinoma, gastric ulcer, and duodenal ulcer risk. *Cancer Res* 1995; **55**(3): 562.
- Carlander D, Kollberg H, Wejåker PE, Larsson A. Peroral immunotherapy with yolk antibodies for the prevention and treatment of enteric infections. *Immunol Res* 2000; **21**(1): 1-6.
- Casswall T, Nilsson HO, Björck L, Sjöstedt S, Xu L, Nord CE, et al. Bovine anti-Helicobacter pylori antibodies for oral immunotherapy. *Scand J Gastroenterol* 2002; **37**(12): 1380-1385.
- Chalghoumi R, Beckers Y, Portetelle D, Théwiss A. Hen egg yolk antibodies (IgY), production and use for passive immunization against bacterial enteric infections in chicken: a review. *Biotechnology, Agronomy, Society and Environment* 2009; **13**(2): 295-308.
- Day AS, Jones NL, Polcova Z, Jennings HA, Yau EK, Shannon P, et al. Characterization of virulence factors of mouse-adapted Helicobacter pylori strain SS1 and effects on gastric hydrophobicity. *Dig Dis Sci* 2001; **46**(9): 1943-1951.
- Eaton KA, Brooks C, Morgan D, Krakowka S. Essential role of urease in pathogenesis of gastritis induced by Helicobacter pylori in gnotobiotic piglets. *Infect Immun* 1991; **59**(7): 2470.
- Evans DJ. Characterization of the Helicobacter pylori urease and purification of its subunits*. 1. *Microb Pathog* 1991; **10**(1): 15-26.
- Horie K, Horie N, Abdou A, Yang JO, Yun SS. Suppressive effect of functional drinking yogurt containing specific egg yolk immunoglobulin on Helicobacter pylori in humans. *J Dairy Sci* 2004; **87**(12): 4073-4079.
- Karakasis M, Walduck AK, Price JD, Pedersen JS, Van Rooijen N. Macrophages are mediators of gastritis in acute Helicobacter pylori infection in C57BL/6 mice. *Infect Immun* 2008; **76**(5): 2235.
- Kuo CH, Hu HM, Tsai PY, Yang SF, Chang LL. A better method for confirming Helicobacter pylori infection in Mongolian gerbils. *J Gastroenterol* 2008; **43**(1): 32-37.
- Kusters J, Gerrits M, Van Strijp J, Vandebroucke-Grauls C. Coccoid forms of Helicobacter pylori are the morphologic manifestation of cell death. *Infect Immun*. 1997; **65**(9): 3672.
- Lachman LB, Ozpolat B, Rao XM, Graham DY, Osato M. Development of a murine model of Helicobacter pylori infection. *Helicobacter* 1997; **2**(2): 78-81.
- Marnila P, Rokka S, Rehnberg Laiho L, Kärkkäinen P, Kosunen TU, Rautelin H, et al. Prevention and suppression of Helicobacter felis infection in mice using colostral preparation with specific antibodies. *Helicobacter* 2003; **8**(3): 192-201.
- Mestecky J, Russell M. Passive and active protection against disorders of the gut. *The Veterinary quarterly* 1998; **20**: 83.
- Mine Y, Kovacs-Nolan J. Chicken egg yolk antibodies as therapeutics in enteric infectious disease: a review. *J Med Food* 2002; **5**(3): 159-169.
- Mohammadi M, Doroud D, Mohajerani N, Massarrat S. Helicobacter pylori antibiotic resistance in Iran. *World Journal of Gastroenterology* 2005; **11**(38): 6009.
- Nomura S, Suzuki H, Masaoka T, Kurabayashi K, Ishii H. Effect of Dietary Anti Urease Immunoglobulin Y on Helicobacter pylori Infection in Mongolian Gerbils. *Helicobacter* 2005; **10**(1): 43-52.
- Ota H, Genta R. Morphological characterization of the gastric mucosa during infection with *H. pylori*. *The Immunobiology of *H pylori*: From Pathogenesis to Prevention*. Ernst PB, Michetti P, Smith PD (eds). Philadelphia, Lippincott-Raven, 1997; PP: 15-28.
- Pounder R, Ng D. The prevalence of Helicobacter pylori infection in different countries. *Aliment Pharmacol Ther* 1995; **9**(2): 33-40.
- Sh AJ, Mousavi S, Salmanian A, Basiri M. Production of chicken egg yolk immunoglobulin against Helicobacter pylori UreC protein by DNA vaccination. *Kowsar Medical Journal* 2011; **15**(4): 197-202.
- Safaralizadeh R, Siavoshi F, Malekzadeh R, Akbari M, Derakhshan M, Sohrabi M, et al. Antimicrobial effectiveness of furazolidone against metronidazole-resistant strains of Helicobacter pylori. *East Mediterr Health J* 2006; **12**(3/4): 286.
- Shin JH, Nam SW, Kim JT, Yoon JB, Bang WG, Roe IH. Identification of immunodominant Helicobacter pylori proteins with reactivity to *H. pylori*-specific egg-yolk immunoglobulin. *J Med Microbiol* 2003; **52**(3): 217.
- Shin JH, Yang M, Nam SW, Kim JT, Myung NH, Bang WG, et al. Use of egg yolk-derived immunoglobulin as an alternative to antibiotic treatment for control of Helicobacter pylori infection. *Clin Vaccine Immunol* 2002; **9**(5): 1061.
- Silva DG, Stevens RH, Macedo J, Albano RM, Falabella MEV, Fischer RG, et al. Presence of Helicobacter pylori in supragingival dental plaque of individuals with periodontal disease and upper gastric diseases. *Arch. Oral Biol* 2010; **55**(11): 896-901.
- Street M, Caruana P, Caffarelli C, Magliani W, Manfredi M, Fornaroli F, et al. Antibiotic resistance and antibiotic sensitivity based treatment in Helicobacter pylori infection: advantages and outcome. *Arch Dis Child* 2001; **84**(5): 419.

تولید آنتی‌بادی‌های نوترکیب می‌باشد. حذف مراحل تولید و تخلیص آنتی‌زن سبب کاهش هزینه تولید آنتی‌بادی‌های نوترکیب شده که در نهایت سبب کاهش هزینه درمان خواهد شد. تولید آنتی‌بادی‌های نوترکیب از ایجاد سویه‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک

26. Sturegård E, Sjunnesson H, Nilsson HO, Andersson R, Areskoug C, Wadström T. Infection with cagA and vacA positive and negative strains of Helicobacter pylori in a mouse model. *FEMS Immunol Med Microbiol* 2001; **30**(2): 115-120.
27. Wang X. Helicobacter pylori infection in a mouse model.
28. Yan J, Wang Y, Shao SH, Mao YF, Li HW, Luo YH. Construction of prokaryotic expression system of ItB-ureB fusion gene and identification of the recombinant protein immunity and adjuvanticity. *World Journal of Gastroenterology* 2004; **10**(18): 2675-2679.
29. Zhao B, Jin NY, Wang RL, Zhang LS, Zhang YJ. Immunization of mice with a DNA vaccine based on severe acute respiratory syndrome coronavirus spike protein fragment 1. *Viral Immunol* 2006; **19**(3): 518-524.
30. Malekshahi ZV, Gargari SLM, Rasooli I, Ebrahimizadeh W. Treatment of Helicobacter pylori infection in mice with oral administration of egg yolk-driven anti-UreC immunoglobulin. *Microb Pathog* 2011; **5**: 32-35.