

## Low Risk Criteria for Abdominal Visceral Injuries During Blunt Abdominal Trauma

Majid Shojaee<sup>1</sup>, Gholamreza Faridaalaee<sup>2\*</sup>, Hamid kariman<sup>1</sup>, Ali Arhamidilatabadi<sup>1</sup>, Anita Sabzghabaei<sup>1</sup>, Saeed Safari<sup>3</sup>, Afshin Amini<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Department of Emergency Medicine, Imam Hussain (AS), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

<sup>2</sup>Department of Emergency Medicine, Imam Khomeini Hospital, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

<sup>3</sup>Department of Emergency Medicine, Shohada Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Received: 15 Apr, 2012      Accepted: 21 Jun, 2012

### Abstract

**Background and Objectives:** The purpose of this study was to determine the criteria which define the low risk patients after blunt abdominal trauma. It may hasten the patients handing and avoid unnecessary imaging and diagnostic. Considerations in low risk conditions.

**Materials and Methods:** All adult patients referred to Imam Hussein hospital emergency department with blunt abdominal trauma and had signs and symptoms of intra-abdominal injury were enrolled to the study and followed for one-month. Collected data analyzed with Chi-square test. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive value of each factor was calculated.

**Results:** From total number of 205 enrolled patients (80% were male and 20% were female). The prevalence of three clinical factors (including's hematuria, shock index above 0.8) and more clinical signs and symptoms at presentation were higher in patient with Intra-abdominal visceral injury than discharged patients ( $P<0.0001$ ). Sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of serious clinical presentation, hematuria, and shock index above 0.8 in the diagnosis of abdominal visceral injury were 100%, 45%, 100% and 17% respectively.

**Conclusion:** This study showed that patients with low-risk criteria in blunt abdominal injury can be discharged without an abdominopelvic CT scan.

**Keywords:** Abdominal injury, Blunt trauma

\*Corresponding author:  
E-mail: grf.aalae@yahoo.com

## مقاله پژوهشی

### معیارهای کم خطر بودن آسیب‌های احتشاء شکمی در بیماران دچار ترومای غیرنافذ شکم

مجید شجاعی: گروه طب اورژانس بیمارستان امام حسین(ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

غلامرضا فریداعلائی: طب اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره)، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران، نویسنده رابط:

E mail: grf.aalae@yahoo.com

حمید کریمان: طب اورژانس بیمارستان امام حسین(ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

علی ارجمند دولت آبادی: طب اورژانس بیمارستان امام حسین(ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

آنیتا سبزقبایی: طب اورژانس بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

سعید صفری: طب اورژانس بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

افشین امینی: طب اورژانس بیمارستان امام حسین(ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

دریافت: ۹۱/۴/۲۸ پذیرش: ۹۱/۷/۳

#### چکیده

**زمینه و اهداف:** مطالعه حاضر با هدف تبیین معیارهای کم خطر بودن آسیب‌های احتشاء شکمی در بیماران مبتلا به ترومای بلاست شکم و ترخیص

سریع تر و بدون نیاز به سی تی اسکن شکم و لگن از اورژانس پایه گذاری شد.

**مواد و روش‌ها:** طی سال ۱۳۸۹ تمامی بیماران بالغ و هوشیار مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) با ترومای بلاست شکم وارد

مطالعه شده و از لحاظ علائم و نشانه‌های آسیب‌های داخل شکمی مورد با پیگیری یک ماهه ارزیابی قرار گرفتند. از آزمون کای دو جهت بررسی میزان شیوع علائم و نشانه‌های بالینی در بیماران با آسیب احتشاء شکمی و بیماران ترخیصی استفاده شد. حساسیت، اختصاصیت، ارزش پیشگویی منفی و مثبت هر یک از

این فاکتورها نیز مورد بررسی قرار گرفت.

**یافته‌ها:** ۲۰۵ بیمار وارد مطالعه شدند (۸۰٪ مرد و ۲۰٪ زن). شیوع نشانه‌های بالینی آسیب شکمی، نشانه‌ها و علائم شکمی به طور توان، نشانه‌های بالینی و علائم آسیب احتشاء داخل شکمی، و سه فاکتور علائم و نشانه‌های بالینی، هماچوری و ایندکس شوک بالای ۰/۸ در بیماران مبتلا به آسیب شکمی

بالاتر از بیماران ترخیصی بود ( $P < 0.001$ ). حساسیت، اختصاصیت، ارزش پیشگویی منفی و مثبت سه فاکتور علائم و نشانه‌های بالینی، هماچوری و ایندکس شوک بالای ۰/۸ در تشخیص آسیب احتشاء شکمی، به ترتیب برابر ۱۰۰٪، ۴۵٪ و ۱۷٪ بود.

**نتیجه‌گیری:** یافته‌های مطالعه حاضر بیان می‌توان بیماران کم خطر با آسیب بلاست شکمی را بدون نیاز به انجام سی تی اسکن مخصوص نمود.

**کلید واژه‌ها:** آسیب شکمی - ترومای بلاست

#### مقدمه

سیستمی و چندسیستمی را ایجاد می‌نماید و تشخیص سریع این نوع آسیب‌ها و تعیین شدت آن کمک شایانی در کاهش مرگ و میر و ناتوانی ناشی از آن می‌نماید (۱). تشخیص دشوار آسیب داخل شکمی به دنبال ترومای بلاست سبب شده بطور روزافزونی از تست‌های تشخیصی نوین مانند CT scan علاوه بر گران بودن، عدم دسترس آسان و اثرات مضر اشعه (۲)، سبب ایجاد ازدحام در اورژانس و تاخیر در اقدامات تشخیصی و درمانی می‌گردد. این امر کیفیت، سرعت و دقیقت درمان را تا حدود

تروماهای بلاست شکم شامل آسیب‌های غیرنافذ ناحیه شکم بوده و تشخیص و درمان سریع آن، باعث کاهش مرگ و میر و همچنین افزایش شانس حیات بیمار می‌گردد (۳). با این وجود ارزیابی آین آسیب‌ها به آسانی امکان پذیر نیست و در اغلب موارد توسط دیگر ترومها مخفی می‌ماند (۴). این در حالی است که آسیب‌های بلاست شکم ۱۱٪ تمام ترومها را به خود اختصاص می‌دهد و عامل مرگ ۸٪ مصدومین سانحه دیده می‌باشد (۵). ترومای بلاست شکمی طیف وسیعی از آسیب‌های خفیف، تک

سپس به بررسی رابطه بین فاکتورهای مورد بررسی با وضعیت آسیب احتشاء داخل شکمی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. فاکتورهای مورد مطالعه شامل علائم و نشانه‌های بالینی آسیب احتشاء شکمی، داده‌های جمع آوری شده بر مبنای شرح حال، شوک ایندکس، هماچوری یا تعداد  $RBC > 50$  بود. داده‌های جمع آوری شده وارد نرم افزار آماری SPSS-18 شد و با استفاده از آمار توصیفی همه متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های کمی پیوسته به صورت میانگین و انحراف معیار و داده‌های طبقه‌ای به صورت درصد بیان گردید. با استفاده از آزمون کای دو رابطه علائم و نشانه‌های بالینی با آسیب احتشاء داخل شکمی مورد بررسی قرار گرفت. سطح معنی داری نیز برابر  $P < 0.05$  در نظر گرفته شد. همچنین با استفاده از محدوده اطمینان ۹۵٪ تفاوت بین حساسیت و اختصاصیت فاکتورهای مورد بررسی در شناسائی ترومما احتشاء داخل شکمی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. بدین صورت که حساسیت و اختصاصیت، ارزش پیشگویی منفی و مثبت فاکتورهای مورد نظر شامل: نشانه‌های بالینی آسیب احتشاء شکمی، علائم و نشانه‌های بالینی آسیب شکمی به طور توانم همچنین سه فاکتور تظاهرات بالینی شامل علائم و نشانه‌های ترومما بلانت ناحیه شکم، هماچوری واضح یا تعداد  $RBC > 50$  در ادرار و نیز شوک ایندکس بالای ۸/۰ به طور توانم، در تشخیص آسیب احتشاء داخل شکمی محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفت.

## یافته‌ها

طی دوره یک ساله مطالعه ۲۰۵ بیمار مورد بررسی قرار گرفت (۸۰٪ مرد). میانگین سنی بیماران برابر ۲۶ سال بوده ( $SD = 24 \pm 26$ ) که ۷۵/۱٪ آنان در محدوده سنی ۱۸ تا ۴۰ سال قرار داشتند. ۴۱٪ (۲۰) بیمار تحت Abdominopelvic CT scan قرار گرفتند که مشخص گردید ۲۱٪ (۱۰/۲) نفر از آنان آسیب داخل شکمی داشته و در بخش بسته شدن. در بررسی علائم آسیب احتشاء داخل شکمی مشاهده گردید شیوع درد شکم ( $P = 0.001$ )، تندرنس شکم و گاردنینگ شکم ( $P < 0.001$ ) در بیماران مبتلا به آسیب احتشاء شکمی به طور معنی داری بیشتر از بیماران تشخیص شده (بدون آسیب احتشاء داخل شکم) بود در صورتی که شیوع استفراغ (۰/۱۸) و تندرنس دنده (۰/۲۳) ( $P = 0.001$ ) داری بین دو گروه نداشت (جدول شماره یک). همانگونه که جدول شماره ۱ نشان می‌دهد (۱۶/۷۶٪) بیمار مبتلا به آسیب احتشاء شکمی و (۶۶/۳۵٪) بیمار ترخیص شده دارای نشانه‌های بالینی ترومای شکم طی معاینه بودند. آزمون کای دو نشان داد که رابطه معنی داری بین بروز آسیب احتشاء شکمی با نشانه‌های بالینی بیمار وجود دارد ( $P = 0.001$ ). بدین مفهوم که شیوع نشانه‌های بالینی ترومای شکم در بیمارانی که آسیب احتشاء شکمی دارند بیشتر از بیماران ترخیص شده می‌باشد. همچنین مشخص گردید نشانه‌های بالینی ترومای شکمی در تعیین آسیب احتشاء شکمی حساسیت ۹۴٪ (۵۸٪/۹۴٪) و اختصاصیت ۶۴٪ (۵۷٪/۷۱٪) دارد. ارزش پیشگویی منفی این روش ۹۵٪ و ارزش پیشگویی مثبت آن ۱۹٪ مشاهده گردید (جدول ۲). در بررسی

زیادی کاهش می‌دهد. معاینه فیزیکی و سونوگرافی مهمترین روش‌های تشخیصی در بیشتر آسیب‌های شکمی هستند. سونوگرافی و لاواژ صفاقی تشخیصی (Diagnostic peritoneal lavage) از حساسیت بالایی در شناسائی عوارض آسیب شکمی برخوردار هستند اما در غیاب جریان آزاد مایع این روش‌های تشخیصی از ارزش پایینی برخوردارند. حتی CT scan نیز مزانتر، رووده‌های پانکراس و دیافراگم دارد (۶/۹-۶). علاوه براین، پزشکان اورژانس معیارهای واضحی برای ترخیص زودهنگام بیماران دچار ترومای بلاست شکمی قبل از انجام Abdominopelvic CT scan ندارند (۱۱-۹). از طرفی، انتخاب صحیح بیماران برای انجام Abdominopelvic CT scan صحیح بیماران کم خطر، از عوارض مضر اشعه جلوگیری کرده و باعث می‌گردد هزینه‌ها در محل صحیح تر صرف شده و نیز تمرکز پرسنل کادر درمان، معطوف رسیدگی به بیماران بدحالتر می‌شود. لذا نیاز است تا معیارهای مناسبی برای تعیین آسیب شکمی و بستری یا ترخیص بیمار تیین گردد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین معیارهایی برای ترخیص سریع‌تر، بدون انجام Abdominopelvic CT scan شکمی پایه‌ریزی شد تا علاوه بر تعیین حساسیت و اختصاصیت معاینات فیزیکی، معیار مناسبی در اختیار پزشکان و پرسنل کادر درمانی قرار دهد تا بر اساس شرح حال و نشانه‌های بالینی، در مورد آسیب بلاست شکمی سریع‌تر و با دقت بیشتری تصمیم‌گیری نمایند.

## مواد و روش‌ها

مطالعه حاضر مقطعی توصیفی- تحلیلی بوده که گروه هدف آن مصدومین بالای ۱۸ سال مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) با هرگونه ترومای بلاست شکمی در سال ۱۳۸۹ بود. معیارهای خروج از مطالعه شامل موارد زیر بودند: بیماران Unstable از لحاظ همودینامیکی، زنان باردار در ۳ ماهه دوم و سوم بارداری، افراد زیر ۱۸ سال، هرگونه سوءصرف مواد (مواد مخدّر، الکل و ...)، مصرف مزمن بعضی داروها مثل وارفارین، اختلال سطح هوشیاری (معیار گلاسکو کمتر از ۱۵)، مسمومیت دارویی، ترومای نافذ شکم، عدم توانایی برقراری ارتباط کلامی جهت شرح حال گیری و عدم انجام پیگیری یکماهه به هر علت. تمامی مصدومین مراجعه کننده به مرکز اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) (طی مدت زمان انجام بررسی) که واجد شرایط ورود به پژوهش بودند پس از جلب رضایت مورد ارزیابی قرار گرفتند لذا نیازی به محاسبه حجم نمونه نبود. سپس برای بیماران بر اساس شرح حال، معاینه، نتایج پاراکلینیکی و پیامد بالینی پرسشنامه اطلاعاتی پر گردید. در شرح حال گیری و معاینات انجام شده درد شکم، خوبیزی گوارشی، استفراغ، افت فشار خون، تاکیکاردي، دیستنشن شکمی، رکتوراژی همچنین اکیموز، اریتم، ساییدگی جدار شکمی، خراشیدگی آن، تندرنس جدار شکم و گاردنینگ شکم مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین در مطالعه حاضر بیماران به دو دسته بیماران بستری و بیماران ترخیص شده طبقه بندی شده و

آن ۱۷٪ بود. لذا با توجه به این یافته ها، می توان بیان نمود بیماران کم خطر شامل تمامی بیمارانی بالغ (بالای ۱۸ سال) و هوشیار، که هیچ یک از تظاهرات بالینی ترومای شکمی، هماچوری و شوک ایندکس بالای ۰/۸ نداشته باشند را می توان با توجه به علائم و تظاهرات بالینی بدون انجام CT scan ترخیص نمود.

## بحث

یافته های مطالعه حاضر بیان می دارند استفاده از علائم بیمار و یافته های بالینی حساسیت و اختصاصیت بالینی در شناسایی آسیب های احتشاء داخل شکمی در بیماران کم خطر دارد. بر این مبنای مشخص گردید بررسی توان فاکتورهای (۱) علائم بالینی، (۲) هماچوری واضح و (۳) شوک ایندکس بالای ۰/۸، حساسیت و ارزش پیشگویی کننده منفی ۱۰۰٪ در تشخیص آسیب احتشاء شکمی دارد. لذا بیماران کم خطر را می توان بدون انجام CT scan و حتی سونوگرافی شکم و لگن، با ذکر علائم هشدار از اورژانس مرخص کرد.

در تایید یافته های مطالعه حاضر Kendall همکاران نیز بیان می دارند که بیماران کم خطر را می توان بدون انجام CT scan شکمی یا هر نوع تست اضافی مرخص نمود (۱۲). okhari و همکاران نیز دریافتند مصلومنین که از لحاظ همودینامیکی و معاینات فیزیکی Stable هستند نیاز به انجام تست های تشخیصی دیگر مانند تست های رادیوگرافی جهت ترخیص ندارند (۱۳).

عالائم بیمار به همراه نشانه های بالینی (به طور توان) مشاهده گردید ۲۰ بیمار مبتلا به آسیب احتشاء داخل شکمی و ۸۲ بیمار ترخیص شده، هم علائم و هم نشانه های بالینی ترومای شکم را داشتند. آزمون کای دو نشان داد وجود هم زمان دو فاکتور در بیماران مبتلا به آسیب احتشاء شکمی بیشتر از بیماران ترخیصی می باشد ( $P < 0.0001$ ) (جدول ۱). همچنین در تشخیص آسیب احتشاء داخل شکمی، بررسی توان علائم و نشانه های بالینی آسیب به شکم حساسیت ۹۵ درصدی (CI: ۰.۸۶-۰.۹۵)، اختصاصیت ۵۵ درصدی (CI: ۰.۴۸-۰.۶۲)، ارزش پیشگویی منفی ۹۹ درصدی و ارزش پیشگویی مثبت ۲۰ درصدی (CI: ۰.۹۵-۰.۹۷) داشت (جدول ۲). اما در بررسی کارائی هر سه پارامتر تظاهرات بالینی شامل علائم و نشانه های ترومای بالانت شکم، هماچوری واضح یا تعداد  $RBC > 50$  در ادرار و شوک ایندکس بالای ۰/۸ مشخص گردید که تمامی بیماران مبتلا به آسیب احتشاء شکمی حداقل دارای یکی از این سه فاکتور بوده در حالی که تنها ۱۰۰ نفر از بیماران ترخیص شده (۰.۵۴/۳٪) یکی از این سه پارامتر بیان شده را داشت (جدول ۱). آنالیز کای دو نشان داد رابطه معنی داری بین آسیب احتشاء شکمی و حضور یکی از سه فاکتور بیان شده (علائم بالینی، هماچوری واضح یا تعداد  $RBC > 50$  در ادرار و شوک ایندکس بالای ۰/۸) در بیماران مبتلا به آسیب احتشاء داخل شکمی وجود دارد ( $P < 0.0001$ ). حساسیت و ویژگی این سه فاکتور به طور توان، در تعیین آسیب احتشاء داخل شکمی به ترتیب برابر با  $0.95 CI: 0.52-0.45$  و  $0.95 CI: 0.45-0.40$  بدلست آمد. ارزش پیشگویی منفی در این روش ۱۰۰٪ و ارزش پیشگویی مثبت

جدول ۱: وضعیت بیماران بر حسب علائم بالینی و نشانه های ترومای

P	بیماران ترخیص شده			بیماران با آسیب شکمی			علائم بالینی	
	درصد	فرآوانی	درصد	فرآوانی	درصد	فرآوانی	درد شکم	تندرننس شکم
۰/۰۰۱	%۲۰/۷	۳۸	%۵۲/۴	۱۱	دارد			
	%۷۹/۳	۱۴۶	%۴۷/۶	۱۰	ندارد			
<۰/۰۰۰۱	%۱۸/۵	۳۴	%۷۱/۴	۱۵	دارد			
	%۸۱/۵	۱۵۰	%۲۸/۶	۶	ندارد			
<۰/۰۰۰۱	%۱/۱	۲	%۱۴/۳	۳	دارد			
	%۹۸/۹	۱۸۲	%۸۵/۷	۱۸	ندارد			
۰/۱۸	%۲۰/۷	۳۸	%۳۳/۳	۷	دارد			
	%۷۹/۳	۱۴۶	%۶۶/۷	۱۴	ندارد			
۰/۲۳	%۸/۷	۱۲	%۲۳/۸	۰	دارد			
	%۹۱/۳	۱۷۲	%۷۶/۲	۲۱	ندارد			
<۰/۰۰۰۱	%۳۵/۹	۶۶	%۷۶/۲	۱۶	دارد			
	%۶۴/۱	۱۱۸	%۲۳/۸	۵	ندارد			
<۰/۰۰۰۱	%۴۴/۶	۸۲	%۹۵/۲	۲۰	دارد			
	%۶۵/۴	۱۰۲	%۴/۸	۱	ندارد			
<۰/۰۰۰۱	%۱۴/۷	۲۷	%۵۷/۱	۱۲	دارد			
	%۸۵/۳	۱۵۷	%۴۲/۹	۹	ندارد			
<۰/۰۰۰۱	%۵۴/۳	۱۰۰	%۱۰۰	۲۱	دارد			
	%۴۵/۷	۸۴	۰	۰	ندارد			
مجموع ۳ پارامتر <sup>۱</sup>								

با استفاده از آزمون کای دو و سطح معنی داری  $P < 0.05$  پارامتر های تظاهرات بالینی، هماچوری واضح یا تعداد  $RBC > 50$  در ادرار و شوک ایندکس بالای ۰/۸

متغیر	مجموع ۳ پارامتر*	علائم و نشانه‌های بالینی ترمومای شکم	علائم و نشانه‌های بالینی ترمومای سینه	نشانه‌های بالینی ترمومای شکم
حساسیت (%)	٪ ۱۰۰	٪ ۹۵	٪ ۹۵	٪ ۷۶ (٪ ۵۸-٪ ۹۴)
ویژگی (CI ٪ ۹۵)	٪ ۴۵ (٪ ۳۸-٪ ۵۲)	٪ ۸۵ (٪ ۸۰-٪ ۹۰)	٪ ۵۵ (٪ ۴۸-٪ ۶۲)	٪ ۹۵ (٪ ۸۶-٪ ۱۰۰)
ارزش پیشگویی مثبت	٪ ۱۷	٪ ۱۰۰	٪ ۹۴	٪ ۹۹
٪ ۱۹	٪ ۹۵	٪ ۶۴ (٪ ۵۷-٪ ۷۱)	٪ ۵۵ (٪ ۴۸-٪ ۶۲)	٪ ۹۵ (٪ ۸۶-٪ ۱۰۰)
٪ ۲۰				
٪ ۳۲				

\*پارامتر های تظاهرات بالینی، هماچوری واضح یا تعداد 50 RBC در ادرار و شوک ایندکس بالای ۰/۸

وجود سرعت بالا در تشخیص و حساسیت بالای آنها از مقبولیت بالینی در تشخیص این نوع آسیب‌ها برخوردار است (۲۰-۲۳). با این وجود اولتراسونوگرافی و آسیب روده‌ها قابل اعتماد نیستند (۲۴-۲۶). همچنین به علت هزینه‌های بالای تشخیصی و تراکم زیاد مصدومین در بخش‌های اورژانس استفاده از این روش‌ها امری زمانبر بوده و باعث تاخیر در تشخیص و افزایش مرگ و میر و ناتوانی‌های ناشی از صدمات بلاست شکمی می‌گردد (۴). لذا نیاز به استفاده از روش‌های دیگری در شناسائی بیماران با ترمومای بلاست شکمی می‌باشد. براساس یافته‌های مطالعه حاضر و آنچه از مقایسات انجام شده بدل است، می‌توان چنین برداشت نمود که در بیماران کم خطر که هوشیاری آنها مناسب است ( $GCS > ۱۳$ ) نیازی به انجام سی‌تی اسکن نیست و در صورتی که علائم و معاینات بالینی این بیماران طبیعی باشد می‌توان آنها را ترمومای نمود. لذا معاینات بالینی و بررسی علائم حساسیت و دقیق بالینی در شناسائی ترمومای بلاست شکمی در ساعت‌های اولیه مراجعه به اورژانس دارد و با معاینه بالینی و شرح حال‌گیری دقیق از بیمار می‌توان کمک شایانی در شناسائی آسیب‌های غیرنافذ بیماران سانجه دیده، کاهش هزینه‌ها و کاهش تراکم بالینی بیماران کرد. از نقاط قوت مطالعه حاضر می‌توان به نحوه نمونه‌گیری آن اشاره نمود. در مطالعه حاضر بیمارانی که سطح هوشیاری طبیعی داشتند وارد مطالعه می‌شدند که همین امر باعث شد معاینات بالینی و شرح حال‌گیری از بیماران قابل اعتماد باشد. علاوه بر این، از پیگیری یک ماهه به جای CT scan شد و این امر از عوارض مواجهه با اشعه بیماران و مصدومین جلوگیری می‌کرد. اما به دلیل اینکه گلد استاندارد تشخیصی ترمومای بلاست شکم رعایت نشد لذا آن را نیز می‌توان از معایب مطالعه حاضر دانست.

### نتیجه‌گیری

در این تحقیق مشخص شد می‌توان بیماران کم خطر را بدون انجام Abdominopelvic CT scan و حتی سونوگرافی شکم و لگن با ذکر علائم هشدار از اورژانس مخصوص کرد. لذا باستی در انجام CT scan در آسیب‌های بلاست شکمی تجدید نظر کرد و از انجام بی‌مورد این روش که هزینه سنگینی را بر دوش بیمار و سیستم بهداشت و درمان کشور می‌گذارد پرهیز نمود.

### تقدیر و تشکر

در این قسمت از دکتر مصطفی علوی مقدم و کلیه همکاران در بیمارستان امام حسین (ع) که در انجام این پژوهش ما را یاری کردند صمیمانه سپاسگزاری می‌گردد.

Poletti (۱۳) که نتایج آزمایشگاهی و رادیوگرافی طبیعی دارند می‌توانند بدون انجام CT-scan تشخیص شوند (۱۴). همچنین Gonzalez (۱۵) همکاران نیز بر این نکته تاکید دارند که معاینات فیزیکی روشی قابل اعتماد در شناسایی آسیب‌های ناحیه شکم و لگن در بیماران هوشیار هستند و رادیوگرافی کمک بیشتری در تشخیص آسیب شکمی و پیامد ناشی از آن نمی‌کند (۱۵). Schurink (۱۶) همکاران نیز بیان می‌دارند که انجام معاینه بالینی قابل اعتماد در مصدومین با ترمومای منفرد شکم و همراه با دیگر ترموماهای ارزش پیشگویی به ترتیب برابر ٪ ۷۱ و ٪ ۸۵ دارد. نویسنده‌گان این مطالعه بیان می‌دارند تنها یک ابزار کمکی در تشخیص این آسیب‌ها می‌باشد (۱). Holmes و همکاران نیز دریافتند بیماران کم خطر را می‌توان بدون انجام Abdominopelvic CT scan اسکن شکمی مرخص کرد (۱۶). اما Rodriguez (۱۷) و همکاران با هدف بررسی صحبت معاینه فیزیکی اولیه و لاواز صفاقی در شناسائی آسیب احتشاء داخل شکمی بیان نمودند خطاهای تشخیصی در معاینات فیزیکی به طور معنی داری بالاتر از لاواز صفاقی می‌باشد و بدین ترتیب لاواز صفاقی تنها تست تشخیصی است که دارای حساسیت و دقیق بالینی در شناسائی مصدومین با ترمومای تنه می‌باشد (۱۷) و مهمترین عنلی که یافته‌های مطالعه Rodriguez و همکاران با مطالعه حاضر همخوانی ندارد نوع انتخاب نمونه‌ای است که در این مطالعه به کار گرفته شده است. در مطالعه Rodriguez A همکاران بیمارانی که حتی آسیب به سر داشته و دارای سطح هوشیاری پایین بودند نیز وارد مطالعه شدند. این امر باعث می‌گردد تا معاینه فیزیکی انجام شده قبل از اعتماد نباشد. از طرفی لاواز صفاقی یک تست تشخیصی تهاجمی بوده که نیاز به بی‌حسی موضعی دارد و اندیکاسیون آن تنها در بیماران پرخطر با خوبی‌تری داخل شکمی می‌باشد. بنابراین شاید لاواز صفاقی تست تشخیصی خوبی جهت تشخیص مصدومین ناحیه شکم باشد اما انجام آن در تمامی بیماران امکان پذیر نمی‌باشد (۱۸). مطالعه micketti (۱۹) و همکاران نیز نشان داد که معاینه ناحیه شکم در مصدومین ترمومای کمر روش قابل اعتمادی در تشخیص آسیب ابدومینوپلیوک نیست و در ۱۰٪ بیماران با علائم طبیعی و ٪ ۷/۶ بیماران با تظاهرات بالینی طبیعی، آسیب ابدومینوپلیوک مشاهده می‌شود (۱۹). یافته‌های این مطالعه نیز چندان قابل اعتماد نیست زیرا با وجود حجم نمونه بالا، بیماران هدف این مطالعه GCS > ۸ داشته که فاکتور مخدوش گر مهمی در انجام معاینه، شرح حال‌گیری و بررسی علائم می‌باشد. آسیب بلاست شکمی امری چالش برانگیز در بخش اورژانس بوده و تشخیص سریع و صحیح آن نیاز به استفاده از ابزار مناسب دارد. امروزه استفاده از اولتراسونوگرافی و CT scan با

## References

- Schurink G, Bode P, Van Luijt PA, Van Vugt AB. The value of physical examination in the diagnosis of patients with blunt abdominal trauma: a retrospective study. *Injury* 1997; **28**(4): 261-265.
- Radhiana H, Azian Abd A. Computed Tomography (CT) Imaging of Injuries from Blunt Abdominal Trauma: A Pictorial Essay. *Malaysian J Med Sci* 2010; **17**(2): 29-39.
- Fesmire F, Brown M, Diercks D, Diner B, Edlow J. Clinical policy: critical issues in the evaluation of adult patients presenting to the emergency department with acute blunt abdominal trauma. *Ann Emerg Med* 2011; **57**(4): 387-404.
- Fakhry SM, Brownstein M, Watts DD, Baker CC, Oller D. Relatively short diagnostic delays (<8 hours) produce morbidity and mortality in blunt small bowel injury: an analysis of time to operative intervention in 198 patients from a multicenter experience. *J Trauma* 2000; **48**(3): 408-415.
- Brenner D, Elliston C. Estimated Radiation Risks Potentially Associated with Full-Body CT Screening. *Radiology* 2004; **232**(3): 735-738.
- Fakhry S, Watts D, Luchette F. Current diagnostic approaches lack sensitivity in the diagnosis of perforated blunt small bowel injury: analysis from 275, 557 trauma admissions from the EAST multi-institutional HVI trial. *J Trauma* 2003; **54**(2): 295-304.
- Allen T, Mueller M, Bonk R, Harker C, Duffy OH. Computed tomographic scanning without oral contrast solution for blunt bowel and mesenteric injuries in abdominal trauma. *J Trauma* 2004; **56**(2): 314-326.
- Valentino M, Serra C, Zironi G, De Luca C, Pavlica P, Barozzi L. Blunt abdominal trauma: emergency contrast-enhanced sonography for detection of solid organ injuries. *Am J Roentgenol* 2006; **186**(5): 1361-1367.
- Ng AKT, Simons RK, Torreggiani WC, Ho SGF. Intra-abdominal free fluid without solid organ injury in blunt abdominal trauma: an indication for laparotomy. *J Trauma* 2002; **52**(6): 1134-1141.
- Federle MP, Crass RA, Jeffrey RB, Trunkey DD. Computed tomography in blunt abdominal trauma. *Arch Surg* 1982; **117**(5): 645-652.
- Livingston DH, Lavery RF, Passannante MR, Skurnick JH, Fabian TC. Admission or observation is not necessary after a negative abdominal computed tomographic scan in patients with suspected blunt abdominal trauma: results of a prospective, multi-institutional trial. *J Trauma* 1998; **44**(2): 273-277.
- Kendall JL, Kestler AM, Whitaker KT, Adkisson MM, Haukoos JS. Blunt Abdominal Trauma Patients Are at Very Low Risk for Intra-Abdominal Injury after Emergency Department Observation. *West J Emerg Med* 2011; **12**(4): 496-504.
- Bokhari F, Brakenridge S, Nagy K, Roberts R, Smith R. Prospective evaluation of the sensitivity of physical examination in chest trauma. *J Trauma* 2002; **53**(6): 1135-1142.
- Poletti PA, Mirvis SE, Shanmuganathan K, Takada T. Blunt abdominal trauma patients: can organ injury be excluded without performing computed tomography? *J Trauma* 2004; **57**(5): 1072-1079.
- Gonzalez RP, Fried PQ, Bukhalo M. The utility of clinical examination in screening for pelvic fractures in blunt trauma. *J Am Coll Surg* 2002; **194**(2): 121-125.
- Holmes JF, Wisner DH, McGahan JP, Mower WR, Kuppermann N. Clinical prediction rules for identifying adults at very low risk for intra-abdominal injuries after blunt trauma. *Ann Emerg Med* 2009; **54**(4): 575-584.
- Rodriguez A, DuPriest Jr R, Shatney C. Recognition of intra-abdominal injury in blunt trauma victims. A prospective study comparing physical examination with peritoneal lavage. *Am Surg* 1982; **48**(9): 457-463.
- Feied C. Diagnostic peritoneal lavage. Questions and answers. *Postgrad Med* 1989; **85**(4): 40-45.
- Michetti CP, Sakran JV, Grabowski JG, Thompson EV, Bennett K, Fakhry SM. Physical examination is a poor screening test for abdominal-pelvic injury in adult blunt trauma patients. *J Surg Res* 2010; **159**(1): 456-461.
- Akgur FM, Aktug T, Olguner M, Kovanlikaya A, Hakguder G. Prospective study investigating routine usage of ultrasonography as the initial diagnostic modality for the evaluation of children sustaining blunt abdominal trauma. *J Trauma* 1997; **42**(4): 626-633.
- Patel JC, Tepas J. The efficacy of focused abdominal sonography for trauma (FAST) as a screening tool in the assessment of injured children. *J Pediatr Surg* 1999; **34**(1): 44-47.
- Soyuncu S, Cete Y, Bozan H, Kartal M, Akyol A. Accuracy of physical and ultrasonographic examinations by emergency physicians for the early diagnosis of intraabdominal haemorrhage in blunt abdominal trauma. *Injury* 2007; **38**(5): 564-569.
- Jacobs DG, Sarafin JL, Marx JA. Abdominal CT scanning for trauma: how low can we go? *Injury* 2000; **31**(5): 337-343.
- Kearney Jrb PA, Vahey T, Burney RE, Glazer G. Computed tomography and diagnostic peritoneal lavage in blunt abdominal trauma: their combined role. *Arch Surg* 1989; **124**(3): 344-347.
- Poletti PA, Kinkel K, Vermeulen B, Irmay F, Unger PF, Terrier F. Blunt Abdominal Trauma: Should US Be Used to Detect Both Free Fluid and Organ Injuries? *Radiology* 2003; **227**(1): 95-103.
- Poletti PA, Mirvis SE, Shanmuganathan K, Takada T, Killeen KL. Blunt abdominal trauma patients: can organ injury be excluded without performing computed tomography? *J Trauma* 2004; **57**(5): 1072-1081.